

AVIS.

Les amateurs et les horticulteurs qui nous feront une commande de plantes sont priés :

- 1° D'affranchir autant que possible leurs lettres ;
- 2° D'indiquer par quelle voie ils désirent recevoir le panier ou la caisse contenant les plantes ou les arbres fruitiers ;
- 3° De désigner la force des sujets, dont les prix diffèrent ;
- 4° De faire connaître de quelle manière ils préfèrent effectuer le paiement de la fourniture.

Nous avons adopté un terme de crédit de trois mois, sauf conventions contraires. Toute expédition dont la valeur n'excéderait pas 50 francs sera suivie en remboursement.

Les plantes indiquées dans le Catalogue étant la plupart cultivées dans l'établissement sont livrables de suite.

Rien n'est négligé pour rendre les colis aussi légers que possible, et pour que les plantes expédiées parviennent à leur destination dans un bon état de conservation.

Les commandes sont expédiées immédiatement et, au plus tard, endéans les huit jours, à moins que l'état de la température ne s'y oppose.

Les amateurs et les horticulteurs qui ne sont point en rapport d'affaires avec l'établissement, sont priés soit d'envoyer une traite du montant de leur commande, soit de se faire connaître par une maison honorable de Bruxelles.

Les frais d'emballage et de transport sont à la charge du destinataire, excepté dans les cas indiqués ci-dessous.

La facilité qu'offrent les communications, depuis l'établissement des chemins de fer et des bateaux à vapeur, nous permet de faire parvenir, en moins de deux jours, tout colis de plantes jusqu'à Cologne, Paris ou Londres. Dès qu'une facture s'élève à 200 francs, nous affranchirons dorénavant jusqu'à ces trois localités, situés à 40, 50 et 60 lieues de Bruxelles. Pour la Hollande, nous affranchirons jusqu'à Anvers.

Bruxelles, 25 février 1854.

EXTRAIT DU CATALOGUE GENERAL

DES

PLANTES ET DES ARBRES FRUITIERS

CULTIVÉS

DANS LES SERRES ET DANS LES JARDINS

DE

J. DE JONGHE,

Bue des Visitandines, 20, à Bruxelles,

ET A LA SUCCURSALE, A S^t-GILLES.

PLANTES NOUVELLES

INTRODUITES DIRECTEMENT DE LEUR PAYS NATAL DANS NOTRE ÉTABLISSEMENT.

Aux amateurs qui en font l'acquisition, nous avons l'habitude de fournir les renseignements nécessaires sur le lieu de station de ces plantes, sur l'époque de leur introduction en Europe et les procédés de culture auxquels elles doivent être soumises, sous nos climats et dans nos serres, pour se maintenir dans un parfait état de conservation. La plupart d'entre elles sont figurées dans le *Jardin fleuriste*, et nous y renvoyons les amateurs, afin qu'ils puissent juger par eux-mêmes de l'importance horticole de ces plantes sous le rapport ornemental. — Les prix, établis suivant la force des sujets et leur degré de rareté, sont marqués plus loin ou seront indiqués aux personnes qui en feront la demande.

Adenocalymma longiracemosum.

Echmea distichantha.

Syn : *Billbergia polystachya* Lindley.

Egiphila.

Trois espèces non déterminées.

Alstroemeria plantaginea.

Amaryllis brasiliensis, var. *Liboni.*

Et plusieurs autres espèces.

Amaryllis reticulata.

Barbacenia macrantha.

— *schidigera.*

Begonia arborescens.

— *luxurians.*

— *princeps.*

— *reticulata.*

— *rigida.*

— *rufifans.*

— *sulcata.*

— *vernicoosa.*

— *verticillata.*

Billbergia Croyana.

— *gigantea.*

— *Liboniana.*

— *Rhodocyanca.*

Billbergia splendida.

— *thyrsoides.*

Plusieurs autres espèces encore indéterminées.

Bunchosia Martiana.

Burlingtonia decora.

Syn : *Burl. amana* Planchon.

Calliandra diademata.

Syn : *Inga splendida* Hort (1).

Capparis flexuosa.

Cordia glomerata.

Charlwoodia fragrantissima.

Syn : *Dracena*, esp. de St-Paul (Brésil).

Cyrtanthera Liboniana.

Syn : *Cyrt. magnifica*, Hort.

Dircœa (Gesneria) lobulata.

Dyckia princeps (2).

— *ramosa.*

Dyckia.

Espèce nouvelle non décrite ni figurée.

Echites illustris.

— *Francisceæ.*

Et plusieurs autres belles espèces.

Encholirion.

Trois espèces très-remarquables, non déterminées jusqu'à ce jour.

Esterhazyia splendida.

Francisceæ eximia.

— *calicyna* ou *confertiflora.*

— *hydrangæiformis.*

— *macrantha.*

Gomphia decora (Le Maire).

Et trois autres espèces non déterminées.

Griffinia Liboniana.

Hippeastrum (Amaryllis) decoratum.

Ilex paraguayensis.

Inga superbiens.

Syn : *rhoifolia* et *ferruginea* Hort (3).

Lobelia thapsoides.

— esp. à fl. blanches de St-Paul.

Mayna brasiliensis.

Syn : *Carpotroche brasil.* Endl.

Metternichia principis.

Metrodorea purpurea.

Deux autres espèces non déterminées.

Mimosa floribunda à fl. roses.

Myrica velutina.

Nidularium fulgens.

Syn : *Gusmannia picta.*

Oncidium varicosum.

Phrynium floribundum (4).

Deux autres espèces non déterminées.

Pilocarpus pinnatifolius.

Psychotria leucocephala (5).

Et plusieurs autres espèces non décrites ni déterminées.

Rhopala corcovadensis.

C'est nous qui, le premier, avons réussi à introduire vivant, du Brésil en Europe, ce beau genre de plantes. Nous en possédons plusieurs belles espèces. Ne les trouvant déterminées dans aucun ouvrage de botanique que nous avons sous la main, nous leur avons appliqué provisoirement les noms des lieux où elles ont été découvertes.

Rhopala Jonghei.

C'est la plus belle espèce du genre, pour l'élégance du port et du feuillage; non encore mise dans le commerce.

Rhopala estrellensis.

— *nutans*, esp. du Minas (Brésil).

— *orgonensis.*

Sapindacée.

Grande espèce non déterminée.

Sapindacée.

Petite espèce non déterminée, plante très-élégante.

Schweiggeria floribunda.

Stanhopea guttulata.

Talauma ovata.

Theophrasta imperialis.

— *lancifolia.*

— *latifolia.*

Urena stellipila.

Syn : *Lebretonia alba*, Hort.

Et un grand nombre d'autres plantes qui seront successivement décrites et figurées.

(1) Feuillage véritablement aérien; inflorescence qu'on regarderait comme de pure invention, si l'on n'en jugeait soi-même d'après nature.

(2) Touffes de feuilles de 2 pieds de diamètre; épis ramifiés hauts de 3-4 pieds; fleurs très-grandes d'un orange écarlate.

(3) Port grandiose; inflorescence d'une magnificence pour ainsi dire orgueilleuse, d'où le nom spécifique; fleurit à 2 ou 3 pieds seulement de hauteur.

(4) Feuillage et inflorescence magnifiques; fleurs violettes.

(5) Feuillage fort ample, sur une tige peu élevée; corymbe ombellé de fleurs blanches, magnifiques.

SERRE CHAUDE.

Il y a une grande différence entre la température que l'on entretient dans une serre aux Orchidées, où la chaleur est généralement moite, et celle qui existe dans une serre chaude, où elle doit être tantôt sèche et tantôt humide. Pour les plantes inter-tropicales, nouvellement introduites, il est assez difficile de connaître le milieu plus ou moins chaud, sec ou humide, qu'il convient de leur accorder. Les serres chaudes étant construites et chauffées de différentes manières, il faut un peu d'expérience pour savoir exactement dans quelle partie de ces serres les plantes devront se plaire davantage. Nous avons classé parmi les plantes de serre chaude un grand nombre de plantes qui demandent au printemps la température d'une serre tempérée, et pendant l'été celle d'une serre froide, ou même le grand air. Du reste, un habile praticien comprend que la rusticité de certaines plantes dépend de leur bonne vigueur, de leur degré de force et de développement. Cette observation s'applique plus spécialement aux arbrisseaux du Brésil.

Pour les plantes appartenant à la famille des Broméliacées, auxquelles un bel avenir est réservé parmi les amateurs, nous avons constaté, depuis six ans, que ces plantes sont plus rustiques qu'on ne le croit généralement. En effet, elles passent l'hiver dans les serres aux Orchidées, dans une serre chaude, tempérée, ou froide. Au moment de l'époque normale de leur floraison respective, elles demandent à être soumises à une température un peu plus élevée, pour mieux développer leur bouquet floral.

Adenocalymma longiracemosum.		Echites illustris	fr. 25 "
	fr. 10 à 25 "	— picta	2 "
Allamanda Aubletii	5 à 10 "	— Rosa campestris	10 "
— neriflora, du Mexique	2 à 5 "	Ferdinandia superba.	10 "
— Schottii	2 à 5 "	Franciscea. V. page 9.	
Almeïdea lilacina.		Friedericia Guilielma	5 à 10 "
Anda Pisonis.		Galipea macrophylla.	50 "
Apeiba, esp. du Minas.		Gardenia lucida	5 "
Aphelandra aurantiaca	5 à 10 "	Genipa americana.	10 à 25 "
Arrudea clusioides	50 "	Griffinia Liboniana	5 "
Barbacenia macrantha	" "	Herinquia floribunda	2 à 5 "
— purpurea	3 à 5 "	Hexacentris mysoriensis.	2 "
— schidigera.		Hoya bella	2 "
Besleria campanulata.	5 à 5 "	— campanulata	3 "
Billbergia. Voyez à la collection		— imperialis	10 "
des Broméliacées, p. 7.		— odorata	3 "
Canna Warszewitziana	2 à 5 "	— variegata.	
— esp. du Brésil, très-bonne		Hymenæa Sellowiana	25 "
plante	2 à 5 "	— stilbocarpa	25 "
Capparis flexuosa (Mart.)	10, 15, 50 "	Isoloma hondensis.	2 à 5 "
Carolinea (Pachira) alba	10 à 20 "	Syn : Gesneria hondensis.	
— sexdigitata	25 "	Inga superbians. (V. la note ⁽²⁾ ,	
— tomentosa	50 "	page 2).	10 à 25 "
Cissus discolor	1 "	Syn : Inga ferruginea et rhoifolia.	
Coccoloba nymphæofolia	25 à 50 "	Ixora coccinea.	3 à 5 "
— peltata	25 à 50 "	— undulata	5 "
Combretum pinciaum	5 à 5 "	Jacaranda Clauseniana.	20 "
Cordia glomerata.	10 à 25 "	— caroba	5 à 15 "
Dichorisandra ovata	5 à 5 "	Limonia rosea.	5 à 10 "
Echites crassinoda	5, 10 à 25 "	— spectabilis.	3 à 5 "
— dichotoma.	3 "	Luhea grandiflora alba.	
— Franciscea	5 à 10 "		

Lubea rosea.		Psychotria leucocephala. (V. la	
Magnolia pumila . . . fr.	5 à 10 "	note ⁽¹⁾ , page 2) fr.	55 à 50 "
Mayua Brasiliensis.		A ce prix, il sera fourni une forte plante	
Metrodorea pupurea. . . 10 à 25 "		originnaire du Brésil.	
Deux autres espèces non déterminées.			
Mimosa floribunda à fleurs roses.		Qualea grandiflora.	
	3 à 5 "	Ravenala madagascarcensis	25 à 40 "
Napoleona imperialis. . . 5 à 10 "		Roupellia grata	3 à 5 "
Pachira (V. Caroline).		Salpingantha coccinea	10 "
Palicourea.		Securidaca glabrata.	
Trois espèces non déterminées.			
Pavetta Borbonica	15 à 25 "	— tomentosa.	
— cafra (1)	5 à 10 "	Spatodea campaulata	15 "
— madagascarcensis	5 à 5 "	— speciosa	10 "
Phrynjum floribundum.	25 à 50 "	Sterculia Blumei	10 "
— sanguineum	3, 5 à 10 "	— elicha.	
Plectranthus concolor pictus	1 "	— foetida.	
Portlandia grandiflora	15 à 25 "	Stiffia chrysantha	5 à 10 "
Posoqueria hirsuta	10 à 25 "	Styrax officinalis.	
		Terminalia, sp.	
		Tradescantia pilosa.	
		— zebrina.	

SERRE TEMPÉRÉE.

Acacia prismatica fr.	2 "	Begonia arborescens fr.	25 "
— Saligna.	2 "	— Boothii	5 "
Aleurites triloba	5 "	— coccinea	2 "
Alloplectus sparsiflorus	5 à 10 "	— cinnamonaria	5 "
Anona palustris.		— crassicaulis	1 "
— sylvatica.		— Dierickxii	1 "
Aralia orientalis.		— Dregei	1 "
Aristolochia ringens.		— heracleifolia	1 "
Asistasia coromandeliana	2 "	— lætevirens	1 "
Banisteria chrysophylla?	2 à 5 "	— luxurians	2 "
— ferruginea.	3 à 5 "	— macrophylla	1 "
Belles plantes grimpantes, qui se chargent			
d'une grande quantité de jolies fleurs, quand			
on a soin de les planter, comme les Bou-			
gainvillea, dans une pleine terre de serre			
tempérée.			
Beaumontia grandiflora.	2 à 5 "	— manicata	1 "
Bougainvillea fastuosa, à fl. vio-		— Meyeri	1 "
lètes	3 à 5 "	— picta	1 "
— spectabilis à fl. jaunes. 3 à 5 "		— Præstoniensis.	2 à 5 "
Belles plantes grimpantes, qui produisent			
tout leur effet lorsque, mises en pleine terre,			
elles ont, comme les Banisteria, pris tout leur			
développement.			
Begonia albo-coccinea	2 "	— prolifera	1 "
		— ramentacea	1 à 3 "
		— rutilans	5 "
		— rigida	2 "
		— reticulata	5 à 10 "
		— rubra veina	3 à 4 "
		— stigmosa	1 "
		— sulcata	2 "
		— undulata	1 "
		— Verdicktii obt. dumanicata. 3 "	

(1) Plante véritablement ornementale par ses gros et superbes bouquets de fleurs blanches.

<i>Begonia vernicosa</i>	fr. 2 "
— <i>verticillata</i>	1 "
— <i>Wallichiana</i>	1 "
— <i>zebrina</i>	1 "
<i>Brexia chrysophylla</i>	5 à 10 "
<i>Bunchosia Martiana</i>	5 à 10 "
<i>Burchellia capensis</i>	1 à 5 "
<i>Calliandra diademata</i>	10 à 15 "
<i>Cantua dependens</i>	2 "
<i>Celastrus aculeatus</i>	5 "
<i>Cestrum aurantiacum</i>	1 à 3 "
<i>Chorisia speciosa</i>	5 à 10 "
<i>Clerodendron capitatum</i>	5 à 10 "
— <i>hastatum</i>	
— <i>viscosum</i>	
<i>Clerodendrum Kamffieri</i>	6 à 10 "
— <i>splendens</i>	
<i>Cæsalpinia serox</i>	5 à 5 "
<i>Coffea arabica</i>	2 à 5 "
<i>Cyclamen europæum</i>	1 "
— <i>neapolitanum</i>	1 à 2 "
<i>Cyrtanthera Liboniana</i>	2 à 5 "

Syn : *Cyrt. magnifica*.

Cette plante se plaît également dans la serre froide pendant toute l'année.

<i>Cyrtanthera coccinea</i>	1 à 2 "
---------------------------------------	---------

Syn : *Justicia cocc. hort.*

<i>Didimocarpus Rhexii</i>	2 "
<i>Dipteracanthus spectabilis</i>	2 à 5 "
<i>Eranthemum variegatum</i>	1 à 2 "
<i>Ficus</i> esp. de Cuba	2 à 5 "
— <i>Neumannii</i>	1 à 5 "
<i>Galipea odoratissima</i>	10 à 25 "
<i>Geissomeria aurantiaca</i>	
— <i>longiflora</i>	2 à 5 "
<i>Gesneria Herbertii</i>	2 "
— <i>Sellowii</i>	5 "
— <i>Vargassii</i>	5 "
<i>Gomphia acuminata</i>	
— <i>ilicifolia</i>	
— <i>decora</i>	25 "
— <i>salicifolia</i>	
<i>Guarea trichilioides?</i>	25 à 50 "
<i>Habrothamnus aurantiacus</i>	1 à 3 "
— <i>Abellii</i>	5 "
— <i>corymbosus</i>	1 à 5 "
— <i>elegans</i>	5 "
— <i>Hugelii</i>	2 "
— <i>Schottii</i>	1 à 5 "

Plus spécialement de serre froide, au printemps.

Hedychium coccineum.

— *Gardnerianum*.

Pendant l'hiver, ces plantes, perdant leurs feuilles, doivent être tenues à sec.

<i>Hibiscus Cameroni</i>	1 à 5 "
------------------------------------	---------

<i>Hibiscus Rosa sinensis</i>	fr. 1 "
— — — <i>Parkeri</i>	2 "
— <i>tiliaceus</i>	3 "
<i>Hillia longiflora</i>	2 à 5 "
<i>Hypocyrtia scabrada (glabra)</i>	2 "
<i>Lagetta linearia</i>	10 "
<i>Lundia</i> , esp. de <i>Bigoniée</i> , à fl. bleues, pl. grimp.	10 à 25 "
<i>Metternichia principis</i>	5 à 10 "
<i>Mitraria coccinea</i>	1 à 5 "
<i>Musa Cavendishii, fort.</i>	5 à 10 "
<i>Noisetia</i> sp.	

Plante grimpante du Brésil.

<i>Oxyanthus versicolor</i>	2 à 5 "
<i>Passiflora alata</i>	5 à 5 "
— <i>cerasifera, fort.</i>	5 "
— <i>galegaeformis</i>	3 "
— <i>pseudo-suberosa</i>	5 "
— <i>quadrangularis</i> , var. <i>Napoleonis</i>	1 à 5 "

Plusieurs autres espèces.

Paullinia sericea.

Petræa sp.

Plante grimp. du Brésil à fl. violettes.

<i>Philesia buxifolia</i>	
<i>Phyllanthron comorense</i>	5 à 5 "
<i>Pincenectia glauca</i>	25 "
— <i>longifolia</i>	25 "
— <i>tuberculata</i>	25 "
— — <i>torsifolia</i>	50 "
— — <i>angustifolia</i>	55 "

Pisonia, esp. du Brésil.

Plumiera, esp.

Plante rare, très-belle, du Brésil, non déterminée.

<i>Poivreia Roxburghii</i> (<i>Hiræa Houlletiana</i>)	5 à 10 "
---	----------

<i>Porlicera hygrometrica, fort.</i>	3 "
<i>Pothos (Anthurium)</i>	

Plusieurs espèces non déterminées.

<i>Pyrolinia aurantiaca</i>	5 à 5 "
<i>Randia</i> sp.	
<i>Rhaphoelepis indica</i>	2 à 5 "
<i>Rhodostoma gardenioides</i>	2 à 3 "
<i>Rhopala campestris</i>	75 "
— <i>corcovadensis</i>	25 à 50 "
— <i>elegans</i>	10 à 15 "
— <i>estrellensis</i>	55 à 50 "
— <i>Jonghei</i>	
— <i>nutans</i>	100 à 150 "
— <i>organensis</i>	25 à 50 "

Et deux autres espèces. Ces neuf esp. de *Rhopala* ont été découvertes par notre collecteur et introduites vivantes dans nos serres. Trois sont mises dans le commerce; les autres le seront successivement.

Rondeletia speciosa . . . fr. 2 à 5 "	Swartzia Flemingii . . . fr. 25 "
Sida integerrima (<i>Abutilon aurantiacum</i>), fort . . . 5 "	— grandiflora 50 "
Simarouba versicolor 50 "	— Langsdorffii 25 "
Siphocampylus microstoma . . . 2 à 5 "	Schweiggera floribunda . . . 5 à 10 "
Solanum villosum 5 à 10 "	Tabernemontana cestroides. 5 à 10 "
Soleanostylis (<i>Cyrtia</i>) aurantiaca . . . 1 à 5 "	— esp. du Mexique. 5 à 10 "
— villosa 5 à 5 "	Talauma ovata, forte plante originaires 40 à 75 "
Sophora littoralis 5 à 5 "	Tecoma stans 5 "
— tomentosa 5 "	— viridiflora 5 à 5 "
Spondias lutea 10 "	Trigonia nivea 5 à 5 "
Stadmannia geniculata . . . 50 à 75 "	— esp. à larges feuilles, non déterminée.
Sterculia Blumei 10 "	Triplaris brasiliensis. . . 10 à 25 "
Stiffia chrysantha 5 à 25 "	Withfieldia lateritia . . . 1 à 5 "

SERRE FROIDE.

Abelia floribunda . . . fr. 1 à 5 "	Jeune bouture de chacune de ces deux espèces à . . . fr. 2 "
— uniflora 2 à 5 "	Chorizema ilicifolium . . . 2 à 5 "
Adamia cyanea 1 à 5 "	Clethra brasiliensis . . . 5 à 25 "
— versicolor 2 "	Cunninghamia sinensis . . 5 à 5 "
Agave. Quatre espèces distinctes.	Cryptomeria japonica . . . 2 à 5 "
Alstroemeria brasiliensis. 2 "	Cupressus funebris . . . 2 à 5 "
— plantaginea 10 "	Embothryum rubricaula . . . 5 "
Cette dernière plante ne fleurit bien que dans une pleine terre formée de feuilles décomposées.	— lanceolatum.
Andromeda retusa 10 "	Escallonia candida 5 "
Anemone japonica 1 "	— macrantha 1 à 5 "
— — var. à fl. incarnat. 1 à 2 "	— vaccinioides . . . 10 à 25 "
Ces deux plantes passent l'hiver dans une pleine terre légère, à l'air libre.	Eucalyptus camadulensis . . . 5 "
Araucaria brasiliensis 2 "	Glycine (<i>Wistaria</i>) sinensis 1 à 5 "
— — jeunes pl. de semis :	Juniperus gracilis 1 "
les douze 15 "	Laurus borbonica. 5 à 5 "
les vingt-cinq. 25 "	— foetens 5 "
Arbutus canariensis 2 à 5 "	Lebretonia coccinea 1 à 5 "
Berberis Darwinii.	Libocedrus chilensis, fort. . . . 5 "
— Fortunei 1 à 5 "	Lobelia thapsioidea 2 à 5 "
Bouvardia flava 1 à 5 "	— espèce voisine du <i>L. thapsioides</i> , par sa hampe florale, à fl. blanches, de St-Paul (Brésil) 5 "
— venusta 1 à 2 "	Mandevilla suaveolens . . . 1 à 5 "
Budleya Lindleyana. 1 à 5 "	— <i>La douzaine</i> , plante de 2 ans. 10 "
Callitria australis 1 à 5 "	Metrosideros buxifolia 2 "
Campanula nobilis 1 "	— salignus, flore violaceo . . . 5 à 5 "
Cette plante se conserve très-bien et passe l'hiver dans la pleine terre légère du jardin.	Passiflora caerulea grandiflora . . 2 "
Cantua buxifolia 2 à 5 "	— esp. à fl. bleues du Mex. 5 à 5 "
— dependens 1 à 5 "	Pilocarpus pinnatifolius. . . 5 à 10 "
Capparis rupestris 1 à 5 "	Phyllanthus juglandifolius. 5 à 10 "
Celastrus aculeatus 2 "	Plumbago Lappentæ. 1 "
Cephalotaxus Fortunei, femelle.	Poinciana Gilliesii 5 à 5 "
— — mâle.	Psidium Cattleyanum . . . 5 à 5 "
	— dichotomum 5 "

<i>Psidium pomiferum</i> . . . fr. 5 à 10 "	<i>Spiræa prunifolia</i> . . . fr. 1 "
— <i>Raddii</i> . . . 5 à 15 "	— <i>Reveesiana plena</i> .
<i>Pultenæa ericoïdes</i> . . . 2 à 3 "	<i>Urena stellipila</i> . . . 2 à 5 "
<i>Quadria heterophylla</i> .	<i>Veronica Andersonii</i> . . . 1 à 5 "
<i>Rhododendrum sikkim Himalaya</i> .	— <i>formosa</i> . . . 1 "
Vingt-deux espèces ou variétés.	— <i>speciosa</i> . . . 1 à 5 "
<i>Skimmia japonica</i> .	— <i>coccinea</i> . . . 2 à 5 "
<i>Spillibergeria japonica</i> . . . 1 à 5 "	<i>Weigela rosea</i> . . . 1 à 5 "

Collections spéciales de Plantes de Serre chaude.

Achimènes.

<i>Atrosanguinea</i> .	<i>Ignescens</i> .	<i>Patens</i> .
<i>Coccinea</i> .	<i>Ingrahami</i> .	— <i>major</i> .
<i>Escheriana</i> .	<i>Kewensis</i> .	<i>Purpurea magnifica</i> .
<i>Ghiesbrechtiana</i> .	* <i>Klei</i> .	* <i>Pyropæa</i> .
<i>Gloxiniiflora</i> .	<i>Longiflora</i> .	<i>Rosea</i> .
— <i>bulbes à fleurir</i> .	* — <i>alba</i> .	* <i>Skinneri grandiflora</i> .
<i>Hirsuta cœrulea</i> .	* — <i>superba</i> .	<i>Venusta</i> .

PRIX : 10 au choix. 5 francs.

N. B. Les espèces précédées d'un astérisque (*) doivent, pour bien se conserver et fleurir d'une manière satisfaisante, être entretenues, pendant l'hiver, en végétation.

Broméliacées.

<i>Æchmea distichantha</i> (1). fr. 25 à 30 "	<i>Dickia princeps</i> , pl. orig.
— <i>Leopoldi</i> . . . 10 à 25 "	— <i>ramosa</i> . . . fr. 5 à 10 "
— <i>Liboniana</i> . . . 5 à 15 "	— — <i>forte pl. orig.</i>
— <i>Rhodocyanea</i> . . . 5 à 15 "	<i>Hechtia</i> , esp. nouv. non déterminée.
— <i>splendida</i> . . . 5 à 15 "	<i>Nidularium fulgens</i> . . . 50 "
— <i>Thyrsoïdea</i> . . . 5 à 15 "	<i>Pitcairnia caracasana</i> . . . 5 "
<i>Bromelia Sceptrum</i> . . . 5 à 10 "	— <i>coccinea</i> . . . 2 "
<i>Dasylirium acrotriche</i> (Bonapartea	— <i>decora</i> . . . 3 "
<i>gracilis</i>) . . . 5 à 10 "	— <i>phœnicea</i> . . . 1 "
<i>Dyckia remotiflora, fort</i> . . . 2 "	— <i>undulata</i> . . . 2 "
	<i>Vriesea splendens</i> . . . 5 "

Et un grand nombre d'autres plantes appartenant à la famille des Broméliacées, qui n'ont pas encore montré leurs fleurs et n'ont pu être décrites ni déterminées.

(1) Inflorescence aussi remarquable par sa singulière disposition en épis compactes et distiques que par son brillant coloris.

Collection de Cactées.

<i>Cereus nocticalus</i> (Lind.) fr. 2 à 5 "	<i>Mammillaria floccigera</i> (Hort.) 2 à 5 "
— <i>pruinosis</i> (H. Berol.) 10 "	— <i>fulvispina</i> (Hort.) 2 à 5 "
— <i>serpentinus</i> esp. de Cuba (fl. albis) 5 à 5 "	— <i>fusca</i> (Otto) 2 à 5 "
— <i>speciosus</i> 1 à 5 "	— <i>hystrix</i> (Mart.) (leucotri- cha, Sch.) 4 à 10 "
— <i>speciosissimus</i> 1 à 5 "	— <i>Karwinskiana</i> (Mart.) 5 à 10 "
<i>Echinocactus Cachtianus</i> (Monv.)	— <i>moschaloantha</i> (Monv.) 10 "
0,5 5 "	— <i>Malletiana</i> , à longues épi- nes, 0,5 à 0,5. 5 à 5 "
— <i>corynodes</i> (H. Ber.) 0,5 à 0,7 2 à 5 "	— à courtes épines, 0,5 à 0,5 5 à 5 "
— <i>mammulosus</i> , 0,2 (hypo- crateriformis) 2 "	— <i>quadrispina</i> (Mart.) 2 à 5 "
— <i>Monvillii</i> 10 "	— <i>setosa</i> 2 à 5 "
— <i>Otonis</i> 2 à 5 "	— <i>rhodantha</i> 5 à 10 "
— <i>pumilus</i> , 0,1 à 0,5. 2 à 5 "	— <i>Schiedeana</i> (Ehr.), 0,2 à 0,5 5 à 10 "
— <i>robust.</i> (H. Berol.), 0,4 à 0,5. 5 "	<i>Melocactus placentiformis</i> 5 "
— <i>scopa</i> (L. et O.) 5 "	<i>Opuntia brasiliensis</i> 5 "
<i>Echinopsis Zuccariniana</i> (Pfeiff.)	— <i>senilis</i> 5 à 5 "
— — <i>nigrispina</i> , 0,5. 7 à 10 "	<i>Phyllocactus Ackermannii</i> (Hort.) 1 "
<i>Epiphyllum truncatum</i> Altenstei- nii, fort 2 à 5 "	— — variété obtenue de cette dernière espèce, mais plus belle 5 "
— <i>aurantiacum</i> 1 "	<i>Peirescia grandiflora</i> (Haw.) 2 "
— espèce nouvelle du Brésil 5 "	— esp. du Brésil 2 à 5 "
<i>Mammillaria acanthoplegma</i> 2 à 5 "	<i>Pilocereus chrysomallus</i> (milita- ris, niger) 10 "
— <i>arietina maguimamma</i> , se- mis de 4 ans 2 "	— <i>glaucescens</i> du Brésil 50 à 150 "
— <i>cirrhiifera</i> (Mart.) 2 à 10 "	
— <i>conopsea</i> (Sch.) " "	
— <i>dolichocentra</i> (obconella Sch.) 2 à 5 "	
— — plante originaire 15 "	
— <i>Endlicheriana</i> 5 à 5 "	

Cette espèce, dans les plantes originaires du pays, ressemble au *Pil. jubatus*; mais elle en diffère essentiellement dans ses reproductions par boutures.

Variétés horticoles de Cactées.

Voyez, pour la description, le *Jardin Fleuriste* de M. Ch. Le Maire, 4^e vol., 2^e livr., Miscellanées, pages 48-50.

Type *Cereus Speciosissimus*.

Duc de Brabant. | *Speciosissimus elegans*. | *Speciosissimus unicolor*.

Type *Phyllocactus Ackermannii*.

Comte de Flandre. | Duchesse de Brabant. | Princesse Charlotte.
Campanulatus. | Amœnus. |

Type Phyllocactus Phyllanthoïdes.

Stevensii.

Type Cereus flagelliformis.

Cereus electus.

Ces dix variétés nouvelles et distinctes ont été obtenues de semis par M. Stevens, président de la Société Linnéenne. Nous avons fait l'acquisition des semis en fleurs.

Des multiplications des neuf premières variétés sont offertes aux amateurs de Cactées rustiques et à floraison facile, aux prix, savoir :

Cinq variétés au choix à 50 fr.; les neuf à 75 fr.

Cycadées.

Cycas circinalis . . . fr. 10 à 25 »	Zamia montana . . . fr. 150 »
— revoluta . . . 25 à 50 »	— muricata . . . 25 »
Dion edule . . . 10 à 25 »	— picta . . . 30 »
Zamia furfuracea . . . 25 »	— spiralis . . . 40 »
— linearifolia . . . 25 à 150 »	— tenuis . . . 50 à 150 »
— mexicana . . . 10 »	— Verbruggiana . . . 55 à 150 »

Cyclanthées et Pandanées.

Carludovicia palmata . . . fr. 5 »	Pandanus furcatus, fort . . fr. » »
Charlwoodia fragrantiss. . 10 à 50 »	— graminifolius . . 5 à 5 »
Pandanus elegans . . . 10 »	— utilis . . . 5 à 25 »
— — très-fort . . . 75 »	— variegatus . . . 20 »

Dracénées.

Dracæna brasiliensis . fr. 5 à 10 »	Dracæna ferrea versicolor. fr. 5 à 10 »
— cernua . . . 5 à 10 »	— marginata . . . 5 à 10 »
— Draco . . . 2 à 10 »	— nobilis . . . 10 à 25 »

Franciscea.

Franciscea augusta (acuminata). fr. 5 à 5 »	Franciscea hydrangeæfor. fr. 5 à 25 »
— calycina (confertiflora, laurifolia). . 5, 5 à 25 »	— latifolia . . . 2 à 5 »
— eximia . . . 5, 5 à 20 »	— macrantha (S ^t -P.). 10 à 150 »
— grandiflora . . . 5 à 10 »	— Pohliana . . . 2 à 3 »
	— rubescens (elegans) 5 à 10 »
	— uniflora . . . 1 à 2 »

De ces dix espèces de *Franciscea*, sept ont été découvertes par M. Libon, et intro-

duites en grande partie dans les cultures par notre établissement. Ce sont les *Franciscea augusta*, *calycina*, *eximia*, *hydrangeaeformis*, *latifolia*, *macrantha*, *Pohliana*. Trois de ces *Franciscea* avaient déjà été mises précédemment dans le commerce; ce sont les *Fr. augusta*, *hydrangeaeformis* et *Pohliana*.

Comme nous avons été assez heureux pour être l'introducteur des plus belles espèces de ce beau genre, qui restera longtemps dans les collections des amateurs et des horticulteurs, nous croyons être utile et agréable en donnant ici les indications les plus importantes relativement à la culture de ces plantes. Il faut à toutes les espèces de *Franciscea*, un compost formé de six parties d'ingrédients différents, savoir : trois parties de bonne terre marnée à froment passée au crible fin, une partie de terreau de feuilles décomposées, une partie de *sphagnum* desséché et coupé en petits morceaux ou de terre tourbeuse et une sixième partie de gros sable lavé. Des pots plus profonds que larges et un bon drainage produisent un résultat avantageux sur la végétation de ces plantes. Le rempotage se fait après la floraison des sujets, quand ils se préparent à l'état de repos. Pendant l'hiver, on place ces plantes dans l'endroit le plus chaud d'une serre tempérée. Dès que les boutons des fleurs apparaissent d'une manière prononcée, on doit mettre ces mêmes plantes dans un endroit plus froid de la serre tempérée. Pendant la bonne saison, on les place dans une serre froide très aérée.

Aux mois d'août et de septembre, on les expose au grand air dans un endroit du jardin où elles puissent être un peu à l'ombre. Si l'on veut que ces plantes restent dans un bon état de végétation, il est nécessaire de leur donner des soins de propreté. Les insectes, qui se montrent quelquefois sur les tiges et sur les feuilles, sont enlevés au moyen d'une éponge humectée d'eau de pluie légèrement savonnée. On seringue ensuite fortement les feuilles et les tiges avec de l'eau de pluie seulement.

N. B. Un certain nombre de semis obtenus de l'*Eximia* et du *Macrantha*, à croissance trapue, nous permettront, sous peu de temps, d'offrir de belles variétés aux amateurs.

Gloxinia.

<i>Alba grandiflora</i>	fr. 1 "	<i>Comte Bobrinski</i>	fr. 1 "
— <i>incarnata</i>	2 "	<i>Comtesse Carolina Thun</i>	1 "
Beau feuillage, croissance trapue, fleurs abondantes, grandes, fond blanc nuancé légèrement d'incarnat; tube corolléen évasé; limbe arrondi, macule distincte d'un coloris cerise.		— <i>Iura Thun</i>	1 "
<i>Alba sanguinea</i>	1 "	<i>Daphne</i>	1 "
<i>Alcadii</i>	1 "	<i>Delicata</i>	1 "
<i>Annulata</i>	1 "	<i>Exquisite</i>	1 "
<i>Baronne de Vrière</i>	1 "	<i>Fytiana</i>	1 "
<i>Carminata splendida</i>	2 "	<i>George Hoogeveen</i>	1 "
<i>Carnea</i>	1 "	<i>Goodii</i>	1 "
<i>Cartoni</i>	1 "	<i>Grandis</i>	2 "
<i>Caulescens</i>	1 "	<i>Griffithii</i>	1 "
— <i>nova</i>	2 "	<i>Handleyana</i>	1 "
Cette variété provenant du <i>Glox. caulescens</i> , en offre divers caractères : les fleurs en sont plus grandes, la corolle en est mieux faite et le coloris d'un amarante plus prononcé.		<i>Joséphine de Beauharnais</i>	2 "
<i>Cerina</i>	1 "	<i>Madame de Layens</i>	5 "
<i>Cheritæflora</i>	2 "	Beau feuillage; fleurs grandes et abondantes; pédoncule raide; gorge blanche et carnée; corolle rose tendre; limbe arrondi, carné et cendré.	
<i>Cælestis</i>	1 "	<i>Mademoiselle de Sombreuil</i>	2 "
		<i>Marie Van Houtte</i>	2 "
		<i>Marginata</i>	1 "
		<i>Maxima</i>	1 "
		— <i>superba</i>	2 "
		<i>Napoléon</i>	1 "

Olympia	fr. 2	»	grandes et abondantes. Cette variété nouvelle se place, pour sa forme et pour son coloris, entre le <i>Carminata splendens</i> et le <i>Rubra elegans</i> .
Picturata	1	»	
Pickwick	1	»	
Pimlico	1	»	
Pressii	1	»	<i>Rubra superba</i> fr. 2
Priestleyana	1	»	<i>Snowiana</i> 1
Princesse Hélène	2	»	<i>Spectabilis</i> 2
Pulcherrima	1	»	<i>Stanleyana</i> 1
Rosa mundi	2	»	<i>Suspenda</i> 1
Rosea alba	1	»	
— maxima	2	»	
— splendens	3	»	
Croissance trapue, grandes fleurs d'un beau rose foncé éclatant; la corolle en est irréprochable.			
Rubra	1	»	
— elegans	2	»	<i>Teichlerii</i> 1
— grandiflora	1	»	<i>Venusta</i> 1
— maxima	2	»	<i>Virginalis</i> 2
— nova	3	»	<i>Wortleyana</i> 1
Beau feuillage, croissance trapue; fleurs moyennes; gorge blanche; tout autour et dans la corolle, coloris d'un bleu pâle; limbes d'un gris cendré. Cette variété, par ses ramifications, est propre à être cultivée en corbeille suspendue.			

N. B. Les *Gl. incarnata*, *Caul. nova*, *Mé de Layens*, *Rosea splendens*, *Rubra nova*, proviennent de nos semis.

Au choix : 10 variétés à 15 francs.
 25 — 25 —

Lantana (Variétés horticoles).

Alba grandiflora.	Lilacino lutea.	Roseo lutea.
Carnea lutea.	Luteo rosea.	— mutabilis.
Flavicomia.	— splendens.	— violacea.
Fulgens mutabilis.	— superba.	
6 variétés au choix 15 francs.		
12 — — — — — 20 —		

ORCHIDÉES

DU BRÉSIL, DE LA COLONNIE, DE CUBA, DE GUATEMALA ET DU MEXIQUE.

Brassavola, esp. du Minas-Geraës.	Cattleya autre esp. non décrite.
Burlingtonia decora fr. 20	— Forbesii.
Catasetum cristatum.	— guttata fr. 25 à 35
Cattleya crispa.	— Harrisonii 10 à 15
— bicolor 25	— intermedia 20 à 35
— bulbosa, à gr. fleurs violettes, esp. très-rare.	— labiata.
— à labelle blanche, esp. très-rare.	— Loddigesii, ou Catt. Papejansiana.
	— Mossii.

Cattleya de St-Paul.
Cycnoches, espèce à fleurs diversement
 picotées.
Cyrtopera Woodfordii.
 — esp. du Minas-Geraës.
Cyrtopodium bracteatum.
 — esp. du Brésil.
 — esp. de Surinam.
Dendrobium fimbriatum.
 — *flavescens moschatum*.
 — *formosum*.
 — *javanicum*.

Epidendrum, esp. de St-Paul, du Brésil.
 — de Guatemala.
 — *macrochilum, albo-roseum*.
 — *phœniceum*.
 — *purpureum*.

Et différentes autres espèces du Brésil qui
 n'ont pas fleuri jusqu'à ce jour dans nos
 serres.
Grobya Amherstiae.
Laelia majalis.
 — *pedunculata*.
 — *Perrinii*. . . fr. 10 à 25 "
 — 5 autres esp. différentes de *Laelia*,
 de la province de Minas-Geraës,
 au Brésil.

Lycaste fulvescens.
 — *tyrianthina*.
Miltonia Morelliana . . . fr. 25 "
 — *Clowesii* 15 "
 — *spectabilis*. 10 à 15 "

Les prix seront fixés suivant la force des sujets et leur degré de rareté.

Miltonia esp. nouv.
Myanthus cernuus.
 — *fimbriatus*.
Neottia, esp. à fleurs rouges.
Odontoglossum grande.
 — *citrosimum* . . fr. 10 à 25 "
 — *hastatum*.
 — *Verheyenianum*.
Oncidium altissimum . . 5 à 10 "
 — *ampliatum*.
 — *crispum* 15 "
 — *flexuosum*. 10 à 15 "
 — *Harrisonii*.
 — *luteum*.
 — *Papilio*.
 — *pubes* 10 à 15 "
 — *pulvinatum*.
 — *varicosum* 35 "
 — Deux esp. terrestres à gr. fleurs,
 des hautes montagnes du Minas-
 Geraës.

Plusieurs autres espèces d'*Oncidium* qui
 n'ont pas fleuri jusqu'à ce jour.

Sophronitis grandiflora.
 — *violacea*.
Stanhopea graveolens.
 — *guttulata*.

Plusieurs autres espèces qui n'ont pas
 encore fleuri.

Zygopetalum brachypetalum.
 — *Makay*.

PALMIERS

DU BRÉSIL, DE JAVA ET DU MEXIQUE.

Acrocomia sclerocarpa.
Areca catechu.
 — *pumila*.
 — *rubra*.
Arenga saccharifera.
Astrocaryum Awarra.
 — *Ayri* fr. 10 à 25 "
 — *mexicanum* 10 à 25 "
Attalea compta.
 — *humilis*. 50 "
Bactris caryotefolia, très-rare.
 — *horrida*.
 — *maraja*. 10 à 15 "
 — *setosa*.
Caryota propinqua . . . 25 à 50 "
 — *urens*.

Chamedorea elegans.
 — *velutina*.
Chamerops humilis . . fr. 2 à 10 "
 — *frond. magn. ovatis*. 5 à 15 "
 — *Palmetto*.
Cocos comosa 15 à 25 "
 — *flexuosa* 10 à 25 "
 — *nucifera* 15 à 35 "
 — *oleracea*.
 — esp. de St-Paul.
Gorypha gebanga.
Diplothemium maritimum.
Dæmonorops asperimus.
 — *melanochètes*.
 — *oblongus*.
 — *rhomboides*.

Dæmonorops rudentum.
Drymophlæus Zippelii
Elais guianensis.
Euterpe oleracea.
Geonoma interrupta.
 — *Spixiana*.
Latania jenkensoniana.
Oenocarpus regius.
Oreodoxa regia.
Oncosperma filamentosa.
Phoenix dactylifera.
 — *farinifera*.
Pinanga coronata.
 — *costata*.
 — *javanica*.

Pinanga Kuhlii.
 — *neega*.
Plectocomia elongata.
Rhapis humilis.
 — *javanica*.
Sabal Adansonii.
 — *esp. de Colombie*.
Saribus olivæformis.
 — *rotundifolius*.
 — *subglobosus*.
Trinax tunicata.
Wallichia (Orania) regalis.
Zalacca Blumeana.
 — *edulis*.

Observation. — Il serait fort difficile de fixer les prix des Palmiers, parce que ces prix dépendent essentiellement de la force et de la rareté des espèces.

Collections spéciales de Plantes de Serre tempérée et froide.

Collection d'Azalea indica.

Aberdenii.
Alba magna.
Albertus.
Amaranthina.
Ambrosii.
Apollo.
Ardens.
Aurantia lucida.
 — *major*.
Bella.
Bianca.
Broughtonii.
Buckinghamii.
Burlingtonii.
Buthfordii.
Candidissima.
Coccinea major.
 — *superba*.
Cœlina.
Comte de Flandre.
Coquette des Flandres.
Corallina.
Crenulata.
Danielsii superba.
Decora.
Delecta.

Diana.
Duc de Brabant.
Duke of Devonshire.
Elegans.
Elegantissima.
Exquisita.
 — *pallida*.
Flora.
Formosa Ivory.
Forsteriana.
Gledistanesii.
 — *varietas*.
Grandiflora.
 — *rosea*.
Holfordii.
Iveryana.
Lacteola striata.
Maculata semi-duplex.
Magnifica.
Malenii.
Melbournii.
Mirabilis.
Mutabilis superba.
Nanquin.
Optabilis.
Perryana.

Præclara.
Præstantissima.
Prima donna.
Pura semi-duplex.
Purpurea major.
 — *rosca semi-duplex*.
Queen perfection.
Reine des Belges.
Robusta.
Rosalia.
Rubens.
Salopiensis.
Sanguinea.
Spectabilis.
Striata formosissima.
Tenella.
Tricolor.
Trotteriana.
Variegata.
Venusta.
Victoria.
Von Hartwig.
Wardii.
Watsonii.
Wellingtonii.
Woolerii.

50 autres variétés plus anciennes à 1 fr. par plante de deux ans.

Au choix : 12 variétés pour 20 fr.; — 25 variétés pour 35 fr.

Les plantes fortes se vendent de 5 à 10 et 15 fr., suivant la rareté des espèces ou des variétés.

Azalea (Grandes nouveautés).

Admiration.	Bealii.	Maria.
Amœna.	Conqueror.	Vesta.
Beauté de l'Europe.	Crispiflora.	Vittata punctata.
Beauty of Reigate.	Criterion.	— rosea.

N. B. Ces variétés et ces espèces ne seront disponibles qu'à l'arrière-saison.

CAMELLIAS.

Le commerce des plantes est en possession d'un assez grand nombre de beaux Camellias, dont les fleurs offrent un coloris très-agréablement diversifié. Plusieurs espèces et différentes variétés ont été introduites, depuis environ un demi-siècle, de leurs lieux d'origine, la Chine et le Japon, dans nos contrées européennes. Un plus grand nombre proviennent de semis faits dans divers pays de l'Europe, en Italie surtout, et dans l'Amérique du Nord. Il est permis aujourd'hui d'être très-difficile dans le choix d'une variété nouvelle, destinée à être admise dans toute collection d'élite. Les conditions requises se résument, selon nous, en ces termes : végétation assez vigoureuse, prédisposition à former des boutons à fleurs vers la fin de la première pousse, soit dans une serre, soit à l'air libre; fleurs pleines et imbriquées; coloris franc, délicat ou relevé; fleurs panachées ou diversement nuancées, mais dont les contrastes produisent de l'effet. Le coloris varie du blanc le plus pur, de l'incarnat, du rose tendre plus ou moins foncé, du cerise, du cinabre et du saumon pâle ou foncé jusqu'au rouge le plus vif. Nous n'avons pas vu de fleurs jaunes, ni d'un lilas pur ou bleu, et d'après les raisonnements de savants physiologues, ces nuances seraient impossibles à obtenir, sauf la jaune ⁽¹⁾, dans les fleurs de Camellia.

En attendant que des semeurs habiles, expérimentés et persévérants viennent doter l'horticulture de ces coloris réputés impossibles, et réussissent ainsi, comme il arrive parfois, à mettre en défaut les prévisions de la science, il faut nous contenter, pour le moment, de ce que nous possédons. Reportons donc tous nos soins, toute notre attention, vers la formation de belles plantes, suivant la forme que peut prendre chaque individu, afin d'en obtenir des fleurs dans toute leur perfection.

C'est un fait acquis à l'horticulture pratique, que le Camellia, à peu d'exceptions près, ne demande pas une forte chaleur artificielle pendant l'hiver: il ne lui faut tout au plus que trois à cinq degrés Réaumur. Au moment de sa végétation et de sa floraison, deux ou trois degrés de chaleur de plus contribuent au développement des boutons à fleurs et à celui des pousses nouvelles. Une position à demi ombragée pendant toute l'année, sous nos climats, lui est également favorable. Des arrosements modérés, pendant l'état de repos en hiver, mais copieux au moment de la floraison et du développement de la sève, ont été reconnus indispensables à la santé du Camellia.

Quant aux indications plus détaillées, concernant la culture des Camellias, on peut consulter notre *Traité spécial* ⁽²⁾.

N. B. Les variétés de Camellia non accompagnées de descriptions n'ont pas fleuri jusqu'à ce jour sous nos yeux.

(1) On annonce, en Angleterre, un Camellia à fleurs décidément jaunes, introduit par M. Fortune.

(2) *Traité de la Culture du Camellia.* BRUXELLES et PARIS.

Collection de Caméllias.

ABBREVIATIONS :

Arr., arrondi; — *ass.*, assez; — *b.*, beau, bien; — *bnis.*, luisant; — *bl.*, blanc; — *carm.*, carmin; — *c.*, centre ou cerise; — *cl.*, clair; — *cr.*, croissance; — *col.*, coloris; — *ext.*, extérieur; — *f.*, foncé, forme; — *fl.*, fleur ou floraison; — *gr.*, grand; — *inc.*, incarnat; — *imbr.*, imbriqué; — *lig.*, ligné; — *m.*, maculé; — *moy.*, moyen; — *ner.*, nervure; — *pan.*, panaché; — *pét.*, pétales; — *p.*, ponctué; — *pyr.*, forme de pyramide; — *rég.*, régulier; — *rub.*, rubané; — *simult.*, simultanément; — *str.*, strié; — *trap.*, trapu; — *tach.*, tacheté; — *tr.*, tricolore; — *t.*, très-tacheté ou tendre; *vég.*, végétation; — *vig.*, vigoureuse.

- Abate Bianchi, fl. imbr. rose; stries bl. au c. des pétales.
 — Branzini, fl. imbr. rouge ponct.
 Adrien Brun, fl. gr. pæonif. ou imbr. rose délicat à stries; blanc pur au c. des pétales.
 Alba Boutourelin, fl. pl. imbr. bl. d'iv.
 — Casoretti, fl. gr., tr. doub, imbr., f. glob. bl. pur.
 — Elysée, jardin d'hiv. à Paris.
 Alba fenestrata, fl. gr., imbr., blanc.
 — formosissima.
 — imbricata, fl. gr., rég., pl. et imbr., fond blanc, pét. arr. et larges.
 — lineata nova, blanc pur à rares stries roses, pæonif.
 — plena Lucina, fl. imbr., bl. pur.; pét. arr. et légèrem. p. de rose.
 — splendens.
 Albertus ou prince Albert, fl. gr. ou moy., pæonif., circ. rég., fond rose, t. vig., str. de lig. rouges.
 Alcina, imbr. rose cl., taches et parfois stries blanches.
 Alexina, fl. gr., imbr., fond blanc, rosé, strié ou tach. de rose vif.
 Alfida, fl. gr., pl., pét. arr., rose uni cl., à nuances bl. aux pétales.
 Amadryos di Cusano, fl. imbr., rouge, limbes des pét. ponct. de blanc.
 Amandina.
 Ambrosoli, fl. imbr. gr., rose, à gr. lignes str. au centre des pét.
 Amelia Benucci, fl. pl. imbr., pét. à la circ. rose t., au c. rose cl., pan. de blanc.
 Angelica, fl. gr., imbr., fond carmin; pét. larges, p. bl. à l'ext.
 Anna Zucchini, fl. toutes blanches et roses carm. simult., renoncudif., flor. fac.; vég. robuste.
 Antonietta Bisi, fl. blanc pur de neige, imbr., forme de l'*Alba plena*.
 Appiani ou Andrea App.
- Arciduca Ferdinando, fl. moy., pl., imbr., pét. ext. rouge c., centre rose, rub. de blanc.
 Armida rosea, gr. fl. imbr., rég., riche col., rose vif à refl. ponct., en belle rosace.
 Augustina superba, gr. fl. imbr. pét. circ. beau rose vif et tendre au centre.
 Aulica, fl. gr. ou moy., pl., rég., blanc carné, veiné d'un rose cendré.
 Aurelia.
 Aurora di Guicciardini, blanc de perle, str. pæonif.
 — de Milan, fl. gr., pl., irrég., d'un beau rose.
 Ayez di Casoretti, fl. gr., tr.-pl., imbrication parfaite, rouge ponceau, centre clair veiné.
 Baltimoreana, fl. tr.-gr., blanc strié de rose délicat.
 Banfi, fl. imbr. pl. rose vif, lig. bl.
 Barchi, fl. moy. pl. imbr., rouge vif veiné et str. de blanc au c. des pét.
 Barni, fl. imbr., rose, pét. à ligne bl. au c.
 Baroue Cossa.
 Baronessa Ciani.
 — Cotti, fl. gr. imb., fond blanc pét. tach. de rose et cerise, belles f. limbes arr.
 Baron Sigismund de Pronay, fl. du *Cam. tr.*, blanc de crème délic., pæonif.
 Beali rosea, fl. imbr., pl., rose.
 Beauty suprême; fl. imbr. pl., rose pâle, cr. raide.
 Beccaria, fl. gr., pl. carm. vif., pét. ronds en spirale.
 Bella di Pistoja, fl. gr. imbr., rose vif.
 — di Pontedera ou Bella di Ponte d'Era, fl. pl. imbr., rose vif, pét. lig. de blanc.
 — d'Etruria, fl. gr. imb., rouge, lig. bl. à la circonfl.
 — della Peschera.

Bella di Firenze, fl. imb., rose, larges lig. bl.
 — di Pisa, fl. gr. imb., rose vif, mac. bl.
 — Eleonora, fl. gr. im., f. de *C. incarn.*, marron foncé.
 — Giuditta, imbr., blanc, stries jaun. aux pét.
 — Toscana, fl. pl., imb., f. du *C. inc.*, pét. ext. rouge vif, puis rouge clair, c. rose tendre.
 Bérénice, fl. imbr., carminé.
 Bergama, parf. imbr., renoncif., gr. fl. rouge saum., pét. lign. de blanc, cendré au centre.
 Bettegno, fl. gr. pl. imbr., pét. gr. arr. rose blanchiss. au c. extr. de pét. cl. à taches bl.
 Bianca Capella.
 — Catarina.
 Binneyii, imbr. cram. lign. bl., vég. vig.
 Birro, fl. moy., rég. pl., beau rouge.
 Bittiniana, imb., rouge foncé, brill. écailles noires.
 Bolongara.
 Borgia, fl. imb., rose veiné lign. bl. aux pét.
 Bradamante, fl. imbr., rose cerise et saum. à mac. bl., gr. fl. à effet, limbes des pét. pâle inc., gr. fl. à effet.
 Brillante di Casoretti, gr. fl. quasi pl. imb., blanc jaune.
 Syn : *Alba Briantina*.
 Brockii, forme de l'*Alba plena*, cer. à lignes bl. dans toute la largeur des pét. du c. à la circ.
 Broggi.
 Brozzoni, fl. gr. imbr., rose écl., nerv. des pét., rose foncé.
 Bullata, fl. gr. la 1^{re} rangée des pét. est imbr. centre de la fl. fasciculé d'un beau rouge-cerise.
 Burdiniana, fl. imb. pl., beau rouge, quelquel. rég. lign. de blanc.
 Camellia de la reine, fl. gr. pl. imb., f. blanc ; quelq. pét. n. de rose.
 Camilla Galli, fl. gr. pl. imbr., blanc d'iv. rayé de rose et carm. aux pét. extér.
 Camillo Brozzoni, forme *Duch. d'Orl.* ; pét. ext. rouge-cerise ou blancs.
 Campo Molendini, fl. moy. rég. imb., rose cram. str. de blanc.
 Candor, fl. moy. rég. imbr. f. bl. pét. taches roses sur 3 ou 4 pét.
 Canova, fl. moy. rég. pl. rouge-cerise, à teintes violac. à la fin de la fl.

Capellano Peregalli, fl. imb., rose.
 Carbonaro nova, fl. imb., pl. rose vif quelq. lign. bl. dans les pétales.
 Cardinale Antouelli, fl. gr. pl. imb. rose écl., larges bandes et str. bl. de l'onglet aux limbes des pét.
 Carlo Alberto, fl. pl., beau rose lis. de blanc.
 Carlotta Grisi, imbr. rouge clair, raie bl. au c. des pét.
 — Nencini.
 Caroline Smith, tr. gr. fl. rose délic., imbrication parfaite, lign. bl.
 — Legmani, fl. imb. rose inc. lign. rouge.
 Carolina nova, fl. moy. imb. très-pl. rose vif, lign. bl. au centre du pét. forme rosace, bonne var. dans le genre des *Palmer's Bealii*, etc.
 Carswelliana nova, fl. gr. imbr. pl. fond blanc ligne rose cer. .
 Syn : *Tunida*.
 Caryophylloflora striata.
 Caryophylloides, fl. imb. rose tendre, strié et l. de ponc.
 Casati, fl. imb. rose marbré, larges pét.
 Casoretti, fl. imb. gr. rose foncé.
 Cataneo, fl. gr. imb. rose vif, parfois 1 ou 2 pét. de bl. lavé de rouge.
 Catarina Lougo, fl. gr. pl. imb. carmin ; pét. st. de blanc.
 Centifolia, gr. fl. ass. pl. imbr., forme de la *Rose à Centf.*, rouge cram., pét. du c. à str. bl.
 — Alba, fl. gr. pl. imbr. blanc d'iv. quelq. taches roses ; pét. du c. str. de jaune p.
 — Rosea, fl. gr. pl. imb. rose r. de blanc ; forme de la *Rose Centf.*
 Cernuschi.
 Cicogna, fl. rouge, taches blanches ou bigarrée, semi-double.
 Clio, imb. moy. bl. st. rose.
 Clotilde, imbr., paonif., blanc pur str. d'un rouge vif.
 — de Milan, forme imbr., beau rouge, stries blanches au c. des pét.
 Clowesiana ou Marochetti, gr. fl. rég. fond blanc, ligné et mac. de rose.
 Coelestina, fl. moy. ou gr. imbr., rose délic.
 Cometa, fl. gr. pl. imbr., rose lign. de blanc.
 Commensa ou reine des fleurs, fl. gr. pl., imbr., beau rose cer. ou saum., souvent pan. de blanc.
 Composita, fl. gr. centif. rose bien imbr.

- Comte de Paris, fl. moy. rég. imbr. pl. fond rose t. bord. bl. et str. de cram.
- Comtesse Rosteau, fl. pl., tr.-gr. imbr., rouge centre, str. de blanc.
- Comte Carini, fl. tr.-rég. flor. fac., beau col. rose à str. blanc., pét. arr. à la circ., ov. au c.
- Crivelli, forme de renonc. rose t. finem. mouch. de carm.
- di Spaur, imbr. gr. fl. rouge violacé.
- Lorenzo Taverna, fl. sing., fond rouge-sang, centre blanc.
- Luppi, imbr., d'un beau rose foncé.
- Maffei, imbr., beau rose vif.
- Comte Pirlo (Faroli), fl. imb. très-pl. rose tendre, pétales arrondis.
- Concordia, fl. gr., form. œill. tr. pl. rose rayé et sablé de carmin, dist. du cam. pr. Albert.
- Connestabili, fl. imb. pl. gr., rose vif saum. pét. lar. et arr.
- Contessa Archinto, fl. pl. imbr., st. de rouge.
- Belgioso, fl. imbr., larges pét. de fond carné, p. de carmin.
- Bouturlin, fl. tr.-gr., pl. imbr., rose foncé, pét. larg., lis. de quelques stries bl.
- Carini, fl. dist., grac. col. blanc écl. à refl. lin. de rose.
- Castelbarco, fl. tr.-pl., imbr., rouge carmin foncé, mac., rayé de bl.
- del Mayno, fl. pl. bl. f. ros.
- di Negro, forme imbr., fond bl., stries roses, quelquefois rose mac. de bl.
- di Pollon, fl. pl. imbr., rose; pét. rég. striés de bl. au centre des pét.
- di Spaur, fl. pl. imbr., bl. d'iv., rayé de rose.
- Contessa Elisabetta, fl. imb. pl. ros. l. bl.
- Fenaroli.
- Maffei, fl. pl. rose t. bl.
- Nencini, fl. gr. pl. imbr. à fond blanc transp. à nombr. pétales rub. au c. de rose, vég. peu vig.
- Rambaldo, fl. imbr. d'un rouge vif, mac. de blanc.
- Samoiloff, gr. fl. pl. imbr., rouge cinabre, mac. de lign. blanc.
- Coquettii, fl. moy. imbr. rouge saum. fond mac. de bl.
- Corsini, forme nouv. rose vif, c. str. de ponceau, tr.-dist.
- Crociata, gr. fl. rég., imbr., rouge lign. de blanc, pét. à ligne blanche; var. vig.
- Crociata Nova, pl. imb., rose-cerise, lign. clair.
- Damiana novella, fl. pl. imbr., beau rouge pourpre, centre clair.
- Danci, fl. imb. rég. pl. pét. très-larges et arr., beau rose, quelq. lign. bl. au milieu des pét. vers le limbe.
- Daviesii, de forme rég. et d'un rouge brill.; cr. vig.
- Dea di Flora, fl. pl. imbr., rose tendre, centre très-pâle.
- Decurrens oblonga.
- rosea.
- De Medici.
- De Notaris, fl. moy. pl. rég. fond cin. nuancé de pourp. ou viol.
- Diana, fl. rég. rose cerise.
- Divonia, fl. imbr., rég., fond bl., nuancé de lil. et de rose tend.
- Docteur Horner, gr. fl. pl. imb., fond rose tend. et cendré, quelq. lign. bl. au bas des pét.
- Donkelaarii, fl. rouge cl. pét. à larges taches blanches, semi-doubl., imbr.
- Don Miguel, imbric. irrég. color. big., rose vif, quelq. pét. d'un rose lig. de blanc.
- Don Pedro, fl. imb. très-gr. rose foncé pét. larges.
- Pedro II.
- Dorina Lechi, fl. doub. rég., rouge vif à mac. et str. de bl. pur, à pét. ronds, rég. tach. de bl.
- Dride, fl. moy. imb., fond rose cendré, lign. de bl.; cr. trapue.
- Syn. : *Iride*.
- Duca Alfieri.
- di Castelbarco.
- di Genova, fl. imb., f. et g. du Cam. *Duch. d'Orl.*, rose rayé de blanc.
- Duca di Guiza, fl. imb. pét. lar. rose vernissé, lig. bl. au mil. des pét.
- Metz.
- Serbelloni, fl. imb. moy. cer. rosé, veiné, strié bl. pét. un peu étroits.
- Duc de Brabant, fl. gr., imb. ou pœonif., pét. arr., fond bl., ligné ou str. de rose.
- Duc de Bretagne, gr. fl. rég., pl., imbr., rose vif, tr.-beau, d'un rose tendre à la fin de la flor.
- de Chartres, fl. imbr., pl., rose brill., quelq. lignes blanches au c. des pét.
- de Litta, fl. assez gr., rég. imb., rose-cerise, pét. à lign. bl.

Duc de Reichstadt, fl. pl. imbr., carmin
vif, mac. ou rayé de blanc.
Duchesse de Montpensier, fl. gr. pl. imbr.,
blanc str. de rose.
— Visconti, fl. très-b. imbr., blanc
carné, bien strié de rouge.
— de Normandie, gr. fl. pl., d'un
beau blanc jaunâtre, parfois des
stries rouges dans les pét.
— de Northumberland, fl. gr. imbr., fond
rose str. cend. aux pét. orig. d'Es-
pagne.
— d'Orléans, fl. moy. pl. imbr., d'un
blanc inc. str. n. de cerise et de
carmin.
Duke of Lancaster, rouge pâle, imbr.
presque plein.
Dunlap's Americana.
Elegans Chamberi, fl. rose foncé, c. mac.
de blanc, ass. pl. imbr.
Elena Boutourlin, fl. pl. imbr., spir. rose
clair, pâle vers le c., liséré de
blanc.
— Longo, fl. de la cr. et forme C.
Duch. d'Orl., plus gr., pl. belle
et mieux imbr.
— Ugoni, fl. pl. imbr., carnée, mac-
ulée et str. de rouge cinabre,
forme de l'*Alba plena*.
Elisa Centurioni, fl. imbr., fond blanc
d'ivoire dist.
Emilia Bona, fl. imbr., rouge-cer., à str.
blanch. au c. des pét.
— Campioni, fl. gr. pl. imbr., laque
carm., circ. rose pâle, large str.
cendrées aux pét.
— Gavazzi, fl. pl. imbr., rég., fond
blanc strié de rouge.
— Taverna, renonculif, pét. extér.
d'un carm. vif, lis. de blanc, pét.
du c. blanc, pan. de carm.
Eminenza, fl. imbr. rose tendre.
Empereur de Russie, fl. d'un beau rose
vif, imbr., pét. str. de blanc.
Enrico Bettoni, fl. pl., pæonif., rouge,
forme partic., taches blanches.
Eructans, fl. imbr. pl. gr., rose vif, les
pét. veinés.
Esperanza di Lombardia.
Ettore Mazucchelli.
Euridice Augusta Wilder.
Eva, fl. d'un blanc pur, pæonif. tr. gr. fl.
Evenemento, fl. imbr. rouge tach. bl.
Exquisita, fl. petite, tr.-double, renoncu-
lif. b. rouge cl.
Feasti, fl. tr.-gr. imbr., à tr.-belle forme,
fond blanc, strié et mac. de rose.
Ferdinanda di Marianni, fl. imbr. rose

tendre, macules bl. dans les pét.
Ferdinand Luvcr. fl. imbr. rouge, l. bl.
Fibbo.
Fimbriata, fl. blanc pur, pl., imbr., limbes
des pét. fimbriés au c.
Firebal.
Flora.
Florenza, fl. imbr., coul. du C. *Duch.*
d'Orl., pét. à points carmin.
Floyii ou Grand Frédéric. G. fl. imbr.,
rose vif.
— alba ou G. Frédéric alba, fl. pl.
imbr. tr.-gr. d'un blanc pur.
Foliolosa, fl. gr., pét. ext. rég., c. pæo-
nif. rouge cer. vif.
Fornarina, fl. tr.-pl. imbr., parf. blanc
pur. pét. arr. lign. carmin ou
rose.
Fortuba.
Fortuita alba, gr. fl. imbr., fond bl., cr.
vig. belle var.
Frederico Gonfalonieri.
Frezolini, g. fl. imbr., beau rouge vif,
renonculif.
Frosti, fl. imbr., d'un rouge foncé vif,
ombré de pourpre.
Galante, fl. imbr., gr., rose pâle.
Garibaldi, fl. imbr., rose pâle veiné de bl.,
vég. tr.-vig.
Generale Bem, fl. imbr., d'un beau rose
vif au c., pét. ronds, légèr. macul.
de blanc.
— Boccari.
— Bonfanti, fl. imbr. rég. pl. tr.-gr.,
pét. larges; rose brillant; fl. à
effet et très-distinctes.
— Coletti, gr. fl. imbr., rose cram.
— Drouot, fl. gr. imbr., d'un beau
cer. rose vif, bande bl. lign. aux
pét.
— La Fayette, fl. imbr. renonculif.
fond rose str. de blanc d'ivoire
ligné de carmin.
— Zucchi, fl. imbr., rose str. ou rayé
de blanc.
Gentil Bresciana, fl. p. imbr., renonculif,
beau rose.
Geometrica, forme imbr., rose tendre.
George Washington, fl. tr.-gr., pl., imbr.,
d'un beau rose.
Geri, fl. imbr., rose foncé, c. ligné de
blanc, forme centf.
Giamma, fl. moy. imbr., rouge tach. de
blanc.
Giardino Franchetti, fl. imbr., pl. gr. pét.
arr. limbes bl., fond blanc carné
tendre, veiné de rouge; fl. dis-
tinctes.

Gioacchino Rossini, fl. tr.-pl. imbr., large, carminé, rayé et teinté de blanc métall., *pet. marg.* au bout de blanc pur.

Gioja della Gazza, fl. imbr., renonculif. pét. arr.; rose brillant et glacé.

Gloria del Verbano, fl. imbr. gr. rouge vif ligné de blanc.

Golia, tr.-gr. fl. imbr., rose saumoné; forme de la *Rosa centif.*, tr.-belle fl. dist.

Grandis (Low). Fl. imbr. pl., rouge mat ou cerise foncé. str. bl. dans les pét. du centre de la fl.

Grand Sultan, gr. et riche fl. rég. imbr. pét. larges, beau rouge vif velouté.
— Tamerlan.

Guillaume Tell, fl. imbr., pét. ext. rose vif, int. rose tendre, tous rub. de blanc.

Gusmannia, fl. rég. rose mat saum.

Guthriana, gr. fl. pl. imbr. beau rouge ponc.

Halley, fl. moy. imbr. fond rose foncé, lign. bl. au c. des pét.

Hamsteadii, gr. fl. imbr., rose magnif.

Harrissonii, fl. gr. imbr. du plus beau blanc.

Heliana, fl. imbr. rose strié de blanc au c. des pétales.

Hendersonii, fl. gr. tr.-pl. imbr. rose délicat quelquefois varié de blanc.

Henri Favre fl. gr. rose saumon veiné.

Honneur d'Amérique, fl. pl. imbr., fond blanc, lignes rouges, jaspé de rose; tr.-dist. de feuell, de port, de forme et de coul.

Il Cigno, gr. fl. imbr. ou pæonif. blanc pur ou strié de jaune.

Il dessinganno, fl. moy. imbr. pl. rouge l. bl. au c. des pét.

Il Favolone, fl. imbr. tr.-pl., rose cram. taches bl. dans les pét.

Il Roberti, gr. fl. rég. pl. imbr. h. rouge-cer. quelq. pét. mac. de blanc.

Il 22 Marzo 1849, fl. imbr. renonculif. fond rouge-cer., pét. l. de bl. limbe bl. nouv. tr.-dist.

Illustris, tr.-belle fl. pl. imbr. moy. beau rouge velouté, quelquel. str. de blanc.

Incarnata, fl. pl. imbr. c. blanc carné; tr.-belle var.

Iride, fl. imbr., rose vif, centre clair, parfois des lignes et t.-bl. dans les pétales.

Isabella Slaone, fl. tr.-gr. imbr. 1^{re} r. de pét. ext. de rose vif. intér. bl. carné, au c. foncé.

Isolina Corsi, fl. imbr. rose piq. et tach. de blanc et de carmin, pét. ext. diaph.

Jacksonii? fl. moy. imbr. fond rouge vif, c. des pét. lign. d'un beau blanc; vég. vig.

Jardin d'hiver, gr. fl. pl. imbr., d'un rouge foncé quand elle s'épanouit.

Jacobella, fl. imbr. gr. et très-double, rose brillant et ponceau; pét. larges; variété très-distincte.

Jubilé, gr. fl. tr.-rég. à larges pét. fond blanc, lavés et striés de rose.

Jupiter, fl. imbr. rose carné vif, à teinte saum., mac. et str. de blanc au c. des pét.

King rubra. Provenant d'un accident de la var. fixée par la greffe.

L'Avvenire, forme imbr., fond rose veiné, extér. des pét. blanc carné.

La Bella di Notte.
— Costituzione, fl. imbr. rose str. bl.
— Esmeralda, fl. imb. pl. bl.
— Favorita, fl. imbr. rouge vif; pét. striés de blanc.
— Graziosa.
— mère Théodète, fl. pl. imbr. rose carminé, c. str. lég. de blanc, beau feuell. et b. str.

Landoni, fl. imb. pl. ros. t. bl.

Landrethi, fl. d'un beau rose, blanchiss. grad. vers le centre, pl. et imbr.

La Padrona, fl. pl. bien imbr., fond rose tendr. rég. rub. de blanc, pét. étr.
— Panetaria.
— Petraja.
— Previdenza, fl. imbr., rose vif, à strie blanche au c. des pét.

La Signora di Monza. fl. pl. gr. imbr., rouge, les pét. du centre de la fl. irr.

Leda, fl. pl. imb. bl. str. de carm. ass. délic., quelquefois accid. de blanc.
— rubra.

Leeana superba ou Coccinea major, fl. gr. pl. imbr., col. rouge saum., flor. tardive.

Leopoldo, fl. gr. bl. ponct. rose.

L'Insubria, imbr. parf., rouge, à bandel. bl. au c. des pét. de l'onglet au limbe.

Lineata tricolor, fl. pl., semi-imbr. forme part., œill. fond bl., rose vif, str. de carmin.

Lombarda, fl. imbr. pl. gr. fond blanc, lignes roses au centre des pét., ceux-ci arr. fl. dans la forme de la Rosa Belgica, très-distincte et méritante.

- Lowii, fl. moy. semi-pl., imbr. tr.-rég.
d'un b. rose saum. ou carm.
- Lucrezia Gazzarrini.
- Maculata grandiflora.
— perfecta, nouv. v. du *C. crociata*,
dont une br. greffée en plac. a offert
des fl. singul^s panachées.
— Harrison, tr.-gr. fl. blanche, de
forme inég.
- Maddelena Lignani, fl. imbr. renoncullif.,
rose cer. vif, bandes d'un bl. inc.
limbes b. et cendr.
- Madoni, dans le genre du *Cam. Galli*,
tr.-gr. fl. imbr. blanc carn. carm.
- Magnifica nova.
— rubra, gr. fl. pl., imbr. rouge saum.
nuancé de blanc.
- Maometto, fl. imbr. roug. le plus vif.
mac. bl.
- Manara.
- Marchesa Teresa d'Ambra, fl. d'admir.
imbr., rose vif à la c. des pét., puis
pâle et rose, au c. des pét. de la
circ. ronds, ceux du c. aigus, fl.
extra doub.
- Torielli, fl. gr. pl. rég. imbr., fond
rose, carminé; pét. à bandel. blan-
ches.
- Marchesa Isambarda.
— Mariscotti.
- Marchiones of Exeter, gr. fl. pl. rég., imbr.
rose.
- Margarita, fl. imbr. rose pâle et vitré.
- Marguerite Gouillon, fl. gr. pl. imbr., fond
blanc, str. et p. de cer. et de
rouge.
- Maria Antonietta, fl. imbr., parf., rosé-
forme, rég., pét. ext. arr., rouge
cl., ligne de bl., rose au c., beau
feuill. cr. vig., pét. div. au c. par
une belle ligne blanche. Ressemble
beaucoup au Jacksoni.
- Elisa.
- Maria Padilla, fl. imbr. tr.-double, pét.
ronds, rose veiné, nuancé d'in-
carnat.
- Teresa, fl. gr. pl. rég., fond blanc,
imbr., vergeté de carmin délic.
- di Luca, fl. pl. imbr. rose veiné et
liséré carné.
- Trivulzio, fl. gr. imbr. incarnat tr.-
délic. à str. de carmin.
- Marietta Benucci, fl. tr.-gr. pl. imbr., pét.
ronds, ceux du c. lignés de blanc.
- Massani, fl. tr.-pl. imbr., anal. au
C. miniata de Low., circ. des pét.
d'un beau rose, c. de la fl. rose
pâle.
- Marino Faliero.
- Martha (Duist), gr. fl. blanches imbr. ma-
gnifique, florifère.
- Mathilde ou Princesse Mathilde, tr.-belle
fl. imbr., rouge vif, str. de bl. au c.
des pét. arr., pét. ext. larges, jolie
fl. dist.
- Mathotiana, gr. fl. pl. imbr. cer. foncé.
- Mazzuchelli, tr.-gr. fl. rég., imb., quel-
ques mac. rouge à strie blanche
au c. des pét.
- Medicea rosea.
- Mediolanensis, fl. imbr. rose pâle veiné
de bl.
- nova, fl. gr. imbr., rose foncé au c.
plus clair à l'extr., lignes bl. au
milieu des pétales.
- Melloni, fl. tr.-gr. pl. semi-imb. pæonif.
rosé (var. dist.) strié et maculé de
rose plus vif.
- Meneghini, fl. imbr. carm. foncé, tach. de
blanc.
- Micans, fl. bien imbr., rose carmin.
- Miniata, fl. moy. ou gr. imbr. pl. renon-
cullif., pet. tr. arr. et larges, fl. fa-
cile et abondante, coul. beau rose
foncé et vif, flor. tardive.
- striata, fl. moy. rég. pl., rose sat.
délic., pét. divisés ég. par une strie
blanche.
- Mistriss Abby Wilder, fl. gr. pl. rég. imb.,
fond bl., stries roses.
- Gunnel, fl. gr. imb. bl.
- Mr Dumoustier, fl. moy. rég. pl. imbr.
fond blanc inc. jaspé de points
roses et lign. de cer. vég. peu vig.
ram. courts et raides, mais se prêt.
à la f. pyr.
- Monstruosa grandiflora.
- Montezuma, fl. tr.-pl. rouge de sang,
forme nouv., plus de 400 pét.
longs et minces! curieux!!
- Montironi alba, gr. fl. pl. imbr. fond blanc.
- rubra, imbr. parf. fond rose car-
min, pét. l. de blanc.
- Muller d'Italie, imbr. irrèpr. fond rouge,
c. des pét. ligné de blanc.
- Multiplicata incognita, fl. imbr., rose vif.
- Murrayana vera, fl. gr. plus que semi-
double, imbr. rose saum.
- Nadina, fl. pl. imbr. fond rouge, taches
et mac. bl. sur tous les pétales, de
var. très-dist. de toutes les autres
de ce genre.
- Napoleone il grande, tr.-gr. fl. imbr. rouge,
parfois veiné ou marb. de blanc.
- Nassiana, rose à fl. tard. imbr. parf. rose
brill. veiné et couv. de taches bl.

Negri, fl. imbr. gr. carnée à pét. str. et ponct. de rose, f. de l'*Alba plena*.
 Nettuno, gr. fl. imbr. parf. rouge, tr. foncé, assez vig.
 Nitida, fl. moy. ou pet. renonc. imbr. fond rose l. à l. bl. cr. peu vig.
 Non plus ultra, gr. fl. imbr. tr. compacte, blanc mac. de rose délic.
 Normanni, fl. moy. imbr. pl. rose, pét. larg. et arr.
 Nymphaeaeflora, gr. fl. imbr. rouge cer. vig. ou rose, pét. arr., syn. *Palmer's perfection*.
 Ochroleuca, fl. moy. imbr. fond blanc, onglet des pét. nuancé de paille, belle forme, vég. peu vig. p. buiss.
 Octave Burnier.
 Oculus Veneris, forme de la *Rosa Centif.*, fl. tr. double et b. imbr., pétales arr. rose vig et striés de blanc argenté.
 Oloferno, imbr. un peu irr. pét. laucéol., à peine arr. à la circ., pointé de bl. pur et sur un fond rose-cerise.
 Onor di Bibbiani, fl. d'une régul. et d'une imbr. irrèpre, fond blanc inc. saup. et l. de rose et de carmin, vég. vig. bande bl.
 Onore della Torre, fl. imbr., fond blanc, pét. nombr.; on l'a décrit ailleurs: fond rose avec lig. bl. au c. des pét.
 Opizzina, fl. pl. imbr. belle f., fond rose à str. blanches, pét. du c. bord. de bl.
 Optima, fl. rég. pét. arr., beau rose vig à bandes et à lig. cram.
 Palagi, gr. fl. rég. pl. pæonif., fond blanc rayé et m. de rose et carmin; fleur à effet.
 Pareito.
 Parini, fl. pl. semi-d. imbr. pét. blanc, rose str. et tach. rose vig ou carm.
 Paxtoni.
 Percevali.
 Peregrina, fl. bl. carné, str. rose.
 Perfecta (Chalmer's), fl. moy. pl. imbr., rose tendre ou foncé, pét. r. tachetés de blanc.
 — globosa, imbr. blanc pur, très-gr. fleur à effet.
 Perpentini, imbr. pl. rose maculé de bl.
 Personata.
 Philadelphica nova, fl. gr. irrég., rouge cer. vig, à tach. bl.
 Pictorum rosea, fl. gr. rég. imbr. col. cer. ou rose vig.
 Pie IX (Far.), fl. imbr. globul. bl. de neige.
 — de Milan, fl. imbr. rose, stries blanches aux pét., c. de la fl. rose pâle.
 Pinzochera, fl. imbr. pl. rose bril.

Pirovano.
 Pisani, fl. moy. tr. pl. rég. imbr. blanc strié et maculé de rose carmin.
 Pisaro, fl. moy. imbr. blanc.
 Powhattan, forme glob., couleur carm. foncé.
 Pozzi, fl. imbr. gr. cram. renonc.
 Præclara, imbr. rouge foncé.
 Prænitens, gr. fl. rég. imbr. rose tend.
 Pratti d'Amérique, fl. moy. rose foncé, une large ligne bl. au milieu de chaque pétale.
 Previdenza, fl. gr. pl. imbr. d'un beau rose plus pâle au c.
 Prince Charles de Schwarzenberg, gr. fl. imbr. rouge vig; taches blanches plus ou moins grandes.
 — de Salerne.
 Princesse Adélaïde, fl. imbr. pl. rouge.
 — Amélie, fl. rose tr.-imbr.
 — Marie, fl. pl. rég., rose saum. vig; l. bl. au c. des pét.
 — royale (Low), gr. fl. semi-d. d'un rouge pâle.
 Principessa Baciocchi, gr. fl. pl. imbr. ponceau à la circ., rose pâle au c.; pét. str. de blanc.
 — Vidoni, var. tr.-dist. à double col. pét. ampl. arr. aux l^{ers} r., nombr. aux suiv., rouge-cer. vig, beau rose ass. t. au c.
 Principe Corsini.
 — di Canino, Syn. *Carlo Bonaparte*, gr. fl. pl. imbr. d'un beau rose cer. cl. veiné, rose f. et mouci, de bl.
 — Anatolio Demidoff, fl. imbr. rose splend.
 — Dovia (Moïse-Marcus), fl. imbr. pl. rose un peu viol., pét. étr., écailles noires.
 — Pietra Santa, fl. pl. f. bl. jaspé de r.
 Procrastinans, fl. gr. imbr. rouge ponceau, str. blanches.
 Proserpine.
 Puccini, syn. *Arctiduchessa Augusta*. Fl. pl. imbr. rouge amar. à la circ. clair au c., quelq. tach. de blanc.
 Pulaski, fl. imbr. d'un beau rose.
 Pulchra, fl. d'un rouge vig, parfois str. de blanc, forme imbr.; pétales larges et arrondis.
 Queen of England (Fielder), fl. moy. pl. imbr. rose tend., pét. arr. ayant au c. une ligne blanche.
 — of Great Britain, fl. moy. rég. imbr. parf. d'un tr.-beau rose.
 — Victoria, fl. gr. rég. pl. beau rouge; pét. trav. au c. par une ligne bl.

- Radiata*, fl. imbr. d'un beau rose et r. brillant; quelq. str. bl. au c. des pét. larges et arr.
- Ralemona*, fl. imbr. pl. rég. d'un beau rose foncé, clair au c. de la fl.
- Rapolini*, fl. gr. renonculif. rég. imbr. pét. arr. col. rose vif carminé, bande longit. bl.
- Redacelli*, fl. pl. imbr. vermillon cl. souv. quelq. pét. lign. de bl.
- Re d'Italia*, imbr. parf., rose vif; moitié des pét. rub. de blanc pur, v. dist.
- Regalis*, fl. gr. rég. pl. rose vif et quelque f. mac. de bl.
- Regina*, fl. gr. pl. imbr. rouge, centre pan. de blanc; cr. rouge.
- Rennica* (Reine d'Italie), imbr., pét. écarl., rosé ou ponctué, demi-sphér.
- Ridolfi*, fl. gr. semi-double, pæonif., d'un blanc à larges stries de carmin ou couleur de sang.
- Ristori*, fl. gr. à ép. fac. pét. arr. imbr. rég. bel et riche col. rose viol. à larg. str. bl. cœur à pet. pét.
- Robertsonii*, fl. rég. pl. imbr. d'un beau cerise écarl.
- Romolo*, fl. élég. col. rose cocc. à bandel. bl. forme rose centif. pét. gr. pl. pet. au c.
- Rosea elegans nova*, rose vif, imbr.
- Rothschildiana*.
- Rubescens*, fl. moy. rég. pl. imbr. d'un beau rose foncé ou saumoné, tr. larges pét. ronds lignés de blanc.
- Rubini*, gr. fl. imbr. magnif. rose glacé, à str. d'un blanc pur au c. des pét. glob.
- Sacco nova*, fl. moy. tr.-rég. imbr., d'un rose tendre.
- Sarah Frost*, fl. pét. imb., rose vif cocciné.
- Scamander*.
- Schiavone*, gr. fl. imbr. rouge; à stries blanches aux bords des pét.
- Sherwoodii*, fl. pl., imbr. d'un beau rose-cerise, strié ou tach. de blanc.
- Sedilla*, tr. gr. fl. d'un blanc rosé, strié et ponctué de carmin.
- Silvio Pirovano*.
- Simmetrica*, fl. pl. imbr. d'une forme modèle, beau rose.
- Sole d'Italia*, fl. pl. rég. fond bl., ligné et lis. de carmin.
- Sormanni*, fl. imb. gr. rose foncé.
- Soulangeana nova*, imb. rose foncé, strié de blanc.
- Sovereign*, fl. gr. double, pl. d'un fond blanc nuancé de carmin.
- Speciosa alba di Guicciardini*, fl. moy., imbr. parf., fond blanc de lait.
- Spini*, fl. imbr. blanc de lait; 2 ou 3 str. de carmin au c. des pét. de chaque fl.
- Squamosa rubra*, fl. pl. imb. rouge, ligné de blanc.
- Stockwelliana*, fl. imb. pl. rose tend., cr. fort trap.
- Sulcata*, fl. rég., imb., moy. renonculif. blanc.
- Sweetiana*, bl. str. et laminé de rouge et de rose.
- Todolini*.
- Targioni*, fl. tr. gr. pl. imb., pét. ronds et larges, fond blanc d'ivoire, tach. ligné et sablé de carmin.
- Teresa Merini*, fl. imb. rose foncé et veiné.
— *Massini*, fl. gr. imb. rouge vif veiné, str. et mac. de bl., v. dist.
- Teutonia*, gr. fl. pl., imbr. couleur toute blanche ou rose sur le même pied rarem. sur la m. br.
- Tommasini*, gr. fl. imbr. pl. rose brillant lég. marg. de blanc.
- Tom Pouce*, renonculif. rose cerise.
- Tornielli*, V. Marchesa Tornielli.
- Transparent*.
- Tricolor*, fl. moy. et gr. semi-double rég. fond blanc et bl. incarn. ligné et flammé de rose et carmin.
- Triomphe de Bergame*.
— de Cernobio, forme rég. blanc tach. de rouge foncé et rayé de nombr. lignes d'un rose délicat.
— della villa Ciani.
- Ubertina*, fl. imb. pl. rose cerise quelq. str. bl. dans les pétales du centre de la fl.
- Valkii* d'Amérique, imb. rouge-cer., str. blanches au c. des pét.
- Variegata alba*, forme imb., rose foncé big. de blanc, pét. à larges taches rouges.
- Varischii*, gr. fl. imbr. rose lavé à lignes blanches.
- Vauxii*.
- Verger d'Italie*, fl. imb. rose délie.
- Verschaffeltiana*, fl. pl. imbr. rose vif, pét. à st. blanche.
- Vessillo di Flora*, fl. gr. pl. imbr. rose lavé de blanc, rég.
- Vestalis*.
- Vesuvio*.
- Victor Hugo*, gr. fl. peu rég. pl. rouge-cer.
- Villageoise*, fl. pæonif. blanc rosé.
- Virginalis*, fl. moy. imbr. fond blanc de lait lég. tach. de r. t., vég. faible.

Visconti nova, fl. imb. carm. mouch. bl.
 Vittata, fl. rég. imbr. coul. rose vif à str.
 blanche argentine au c. des p.
 Vittoria magnosa, fl. gr. imbr. tr.-rég.
 fond rose tr.-vif, larges lignes bl.
 aux pét.
 — Radaelli, fl. moy. imbr. fond rose,
 lign. bl. aux pét.
 Vulcano, gr. fl. les deux rangées des pét.
 ext. imb., les pét. du centre de la
 fl. semi-double fasciculés, coul.
 rouge de sang, tach. bl., dans les
 pét.
 Wadii, fl. blanche double, pæonif., par-
 fois imbr.

Washington (Général), fl. moy. imbr.,
 rég., pl. blanche à reflets de paille,
 mac. ou str. de rose quelquefois
 rose et bl.

Washingtonii ou Georges Washington,
 fl. gr. pl. imbr. beau rose tr.-vif.
 Wilderi, rose tendre.

Yellow (Fortune), fl. pæoniforme et jau-
 nâtre, dit-on.

Cette variété a été introduite récemment
 en Angleterre par M. Fortune. Elle a montré
 ses premières fleurs en Europe, chez M^{rs} Stan-
 disch et Noble à Bagshot.

Zali.

N. B. Nous n'avons pas indiqué les prix à la suite des noms, mais nous les ferons con-
 naître aux personnes qui les demanderont, en désignant les variétés de *Cumellia* désirées.

Dans une collection aussi étendue que la nôtre, il serait difficile d'avoir constamment
 toutes les variétés disponibles. Bien que nos multiplications soient très-nombreuses aujour-
 d'hui, elles sont placées de manière à ce qu'on puisse s'assurer à l'instant de celles qui
 existent et établir des prix relatifs, selon la force des sujets et leur degré de nouveauté.

Collection de Fuchsias.

Abondance.	Eastern Beauty.	Pagoda.
Admirable.	Elegance.	Perfection.
Admiration.	Emma.	Orion.
Ajax.	Enchantress.	Pic IX.
Albano.	Exquisite.	Président Porcher.
Alboni.	Fair Rosamond.	Prince Arthur.
Aldégonde.	Flavescens.	Prince of Whales.
Alfred.	Gem.	Princesse de Lamballe.
As you like it.	— of the Season.	Psyché.
Beauty of Dalston.	— of the West.	Purity.
— Leeds.	Great Master.	Queen of May.
— Chelmsford.	Hébé.	Respondent.
— Richmond.	Hendersonii.	Roi de Rome.
— suprême.	Julia Crisi.	Serratifolia. <i>Species.</i>
Bride.	Kossuth.	— alba.
Brillant.	Lady Dartmouth.	— carnea.
Caractacus.	Lord Nelson.	Sidonia.
Clapton Hero.	Louis le Grand.	South Devon.
Commodore.	Macrantha. <i>Species.</i>	Splendida.
Conciliation.	M ^r Le Bois.	Splendidissima.
Conspicua.	Masséna.	Unique.
Diadem of Flora.	Mathilda.	Voltigeur.
Diana.	Mazeppa.	White perfection.
Distincta.	Nonpareil.	Yorkshire Eclips.
Don Giovanni ou don Juan.		

12 variétés pour 8 fr.; — 25, 15 fr.; — 50, 25 fr.

N. B. Des variétés plus anciennes, et encore disponibles, en grands exemplaires, seront
 fournies avec noms au même prix.

Les toutes dernières nouveautés seront livrées au prix du commerce.

Collection de Pelargonium.

Ajax.	Eugène Furst.	Painted Lady.
Aldermann.	Feldmarshal.	Painter.
Alibi.	Gem of the West.	— improved.
Alonzo.	Geometricum.	Pretender.
Angelina.	Gipsy Bride.	Prince Arthur.
Ariel.	Governor.	Prince of Orange.
Armada.	Grace Darling.	Princess.
Astrea.	Grandiflorum.	Princess royal.
Bacchus.	Grenadier.	Queen of May.
Black Prince.	Guilliema.	— Victoria.
Brillant (De J.).	Gustavus.	Rebecca.
— (Topping).	Honora.	Rolla.
Basalisk.	Isabella.	Rosa.
Cardinal.	Junii.	Rosalind.
Cassandra.	Magnificent.	Rosca striata.
Cavalier.	Major Domo.	Rowena.
Centurion.	Meleager.	Ruby.
Champion of Devon.	Mary, Queen of Scots.	Sara.
Commander.	Mina.	Sarah.
Conspicuum.	Mount Etna.	Satisfaction.
Constance.	— Hecla.	Shylock.
Coquette.	M ^r Mangle.	Star of the West.
Cracker.	Nandée.	Stolz.
Cupp.	Negrees.	Tyrian queen.
Datzle.	Nepaulese chief.	Unique.
Desdemona.	Non Such.	Vanstry.
Diana.	Ocellatum.	Virgin queen.
Distinctum.	Ondine.	Vivid.
Dorcas.	Optimum.	Wappers.
Elegans.	Orlando.	Windsor.
Emilia.	Oscar.	Zéline.
Emily.		

Prix : 1 à 5 francs la plante, suivant la nouveauté et la force des sujets.

Dans mes semis de Pelargonium de 1851 et 1852, il s'est trouvé plusieurs variétés distinctes et très-belles. J'ai voulu les voir re fleurir pendant l'été de 1855. D'après cette seconde floraison, j'en ai choisi quelques-unes dont il a été fait des multiplications pour être offertes aux amateurs. — Chaque nom est accompagné de la description de la plante en fleur faite au moment de la floraison pendant les étés de 1852 et 1855. — Les prix sont assez modérés pour que tous les amateurs puissent se donner le plaisir de posséder ces variétés dans leur collection.

Apollon. Croissance vig., pét. ferme, bouquet de 5 ou 6 fleurs moy., fond blanc, larges macules d'un brun violacé, liséré de blanc tout autour.	Caroline d'Airoles. Végét. ferme, péd. courts et roides, 4 ou 5 fleurs grandes; pét. inf. blancs nuancés de rose incarnat; gr. macules brunes terminées par une auréole cramoisie. Les limbes de la corolle nuancés d'un beau rose. Très-jolie variété.
Auroré. Croissance trapue, pét. ferme, bouquet de 5 ou de 6 fleurs; pét. inf. blanc incarnat; pét. sup. marquées de larges macules brunes, lisérées de rose.	D ^r Lund. Fl. abond., gr., fond blanc

- nuancé de rose tendre; pét. sup. marqués de larges macules brunes, terminées par un liséré corise.
- Flora. Végét. vig. et ferme; gros bouquet; fl. abond., gr. fl.; pét. sup. d'un beau rose foncé; grandes macules; gorge blanche; pét. inf. d'un blanc rosé.
- Franciscodi Serpe. Cette variété provient de Governor. La croissance en est plus roide que celle de la variété Cuy; fleurs grandes, rouge violacé, dans le genre de Compétitor; les macules en sont plus prononcées.
- Guide. Bouquet de 4 ou 5 fleurs moy.; pét. inf. rose pourpré; pét. sup. d'un rose foncé; larges macules brunes veloutées, lisérées de blanc tout autour.
- Kampbloem. Feuillage et structure roides; pét. ferme; bouq. de 4 ou 5 fl. moy.; gorge blanche; pét. inf. roses; pét. sup. marqués de larges macules chocolat, lisérées de rose pâle tout autour.
- La Perle. Croissance vig.; péd. roide; bouq. de 5 ou 6 fl. gr.; pétales arrondis; inf. fond blanc, sup. à macules prononcées, terminées par une auréole feu, puis un liséré pâle incarnat.
- Macranthum. Var. à croissance vig.; péd. ferme; bouq. de 5 ou de 6 fl. gr.; fond blanc nuancé de rose; macules larges et foncées. Perfection de Grandiflorum.
- Marthe. Vég. roide, trapue; péd. ferme; bouq. de 5 fl. moy., fond d'un beau rose foncé; macules très-prononcées.
- Multiflorum. Cette variété provient de Star, mais elle n'en a pas les défauts. Croiss. roide, trapue; péd. ferme; fond blanc; gorge blanche; pét. inf. lavés de rose; de larges macules brunes veloutées couvrent presque tout à fait les pét. inf., lisérés de rose pâle tout autour.
- Styf. Structure roide. Bouquet de 5 ou 6 fl. moy.; pét. planes et fermes; les inf. d'un rose violacé; les sup. d'un rose plus foncé et largement maculés, lisérés de violet.

Ces variétés seront vendues et livrées aux prix suivants :

6 variétés, au choix, pour 50 fr. ; — 12 pour 50 fr.

Collection choisie de Geraniums,

DITE DE FANTAISIE.

Advancer.	Elegans.	Marginata.
Anette.	Erubescens.	Maria.
Ariel.	ÉTOILE DE MARIMONT.	Marion.
Carlotta Grisi.	Exquise.	Minerva.
Cœlestial.	Fairy Queen.	Nec plus ultra.
Criterion.	Hortensia.	Othello.
Defiance.	Isabella.	Prima Donna.
Delecta.	Jenny Lind.	Triumphans.
Electra.	Lady Downer.	

6 au choix, 20 fr. ; — 12, 35 fr. ; — 20, 50 fr.

ÉTOILE DE MARIMONT, à 10 fr. pièce.

Chrysanthèmes de choix,

À GRANDES ET À PETITES FLEURS.

15 variétés pour 10 fr. ; — 25, 15 fr. ; — 50, 25 fr.

Iris Germanica.

12 variétés pour 5 fr.; — 25, 10 fr.; — 50, 20 fr.

Collection de Phlox.

Adonis.	Eugène Fürst.	Mignonnette.
Alba cœrulea.	Fleur de Marie.	Mina.
— kermesina.	Général Changarnier.	Marie Bellanger.
Alphonse Karr.	George Liegel.	Napoléon.
Angelica.	Gérard de St-Trond.	Numa.
Ariadne.	Joseph Antoine.	Orphée.
Armand Dartois.	Kléber.	Pallida.
Attila.	La Dame Blanca.	Pic IX.
Beauté suprême.	L'étendard.	Princesse Marianne.
Bouquet tout fait.	Lucina.	Rève d'amour.
Châteaubriand.	Macrantha.	Rosine.
Colbert.	Madame de Courcel.	Rubra grandiflora.
Comtesse de Chambord.	— de Lierval.	Schlachteri.
— de Quélen.	— de Poivre.	Souvenir.
Cormenin.	M ^{lle} Adam.	Striata.
Crépuscule.	— Larivière.	Velutina.
Depressa.	Marius.	Villaret-Joyeuse.

6 variétés, au choix, pour 5 fr.; — 12, 5 fr.; — 25, 10 fr.; — 50, 20 fr.

Variétés plus nouvelles.

Aglæ Adanson.	Docteur Guersent.	M ^r de la Vallière.
Albicans.	Duc de Cazes.	Marie Lierval.
Alice Allain.	F. Ferrand.	Primulaeflora.
Aaron de Var.	La Fiancée.	Rubra superba.
Deuil de la Comtesse de	L'abbé Bellanger.	Société Bourbonnaise.
Marne.	M ^{me} Boucharlat.	Souv ^t de Marie-Thérèse.
Doux réveil.	— Teinturier.	Vice-président Adam.

Le prix, au choix, est fixé :

12 variétés pour 5 fr.; — 20 pour 10 fr.

Les hautes dernières nouveautés seront fournies au prix du commerce.

Phlox nouveaux obtenus de semis.

BRILLANT. La tige s'élève à 50 centimètres; gros bouquet; fl. moy. abondantes; pét. et corol. arrondis, coloris rouge violacé, oeil rouge prononcé.		gros bouquet ramifié; fl. gr. pét. arr. d'un rose pâle cendré.
Conspicua. La tige s'élève de 25 à 50 cent.;	Floribunda. La tige s'élève à peine à 25 cent.; gros bouquet; fl. moy. rose lilacé, lignes claires, centrées.	Hydrangæformis. La tige s'élève à 35

- cent.; gros bouquet ramifié; fl. moy. d'un rose lilas brillant.
- La toilette. La tige s'élève à 25 cent.; bouquet, fl. moy. viol., pét. et cor. arr., œil blanc.
- La belle Marie. La tige s'élève à 30 cent.; bouquet large; gr. fl., pét. et cor. arr. d'un beau lilas pâle, œil clair, très-jolie var. distincte.
- M^{me} Adelaïde de Burlet. La tige s'élève à 20 cent.; très-large bouquet, pét. et cor. larges et arr.; rose tendre, œil vif, variété distincte.
- M^{me} de Jonghe. La tige s'élève à 18 cent à peine; très-gros bouquet, pét. et cor. arr. rose très-tendre, variété distincte sous tous les rapports.
- Souvenir de Villers. La tige s'élève à 35 cent.; bouquet gros et ramifié; fl. gr.; rose foncé, œil rouge à effet.
- Triomphe des pyramidales. La tige s'élève à 45 cent.; bouquet fort ramifié, fl. gr. rose lilacé, taches blanches sur les pétales; pét. et panicules arrondis.

Des multiplications de ces dix variétés seront fournies, à compter du 1^{er} avril prochain, au choix de l'amateur, à raison de deux francs la plante. La collection des dix nouveautés est cotée à quinze francs.

ARBRES FRUITIERS.

Cerisiers.

- Belle de Choisy, genre de griotte, à chair succulente très fine; à courte queue; fruit assez gros; excellent.
- de St-Gilles (De J.), genre de griotte, très prod., gros fr. succulent et légèrement acidulé.
- Bigarreau de Mezel, très-gros fruit, rouge; excellent.
- gros Carret, très-gros et bon fruit, tardif.
- Butner's Black Heart, fr. de 2^e qual. et grandeur, tr. product.
- Carnation Coe's late, gros fr. à matur. tardive; excell.
- Courte queue (la grosse), g. de griotte, tr. prod. et l'une des meilleures cerises cultivées: aussi est-ce la seule, avec la Griotte de St-Gilles, que nous ayons multipliée abondamment.
- Downer's Late Red (fr. améric.), fr. de 1^{er} qual, grandeur moy.
- Griotte d'Ostheim, esp. orig. d'Espagne, servant particulièrement à la plantation pour la raspe dans des terrains accidentés.
- de St-Gilles (De J.), gros et beau fr., à petite pierre, à chair d'un beau rouge cram. et d'un goût très-agréable, légèrement acidulé. La queue, assez forte, a 0^m,5 de long. L'arbre, obtenu de semis, il y a neuf ans, d'un beau port, est très-fructifère. Le fruit en devient mûr du 15 au 25 juillet.
- Joffry's Luke, fr. hâtif de bonne qual.; var. formant un bois court et gros; très-productif.
- May Duke, ou cerisier anglais, hâtif, généralement connu.
- Pyramidal, très-gr. fr. rouge, à longue queue; espèce de gros guignier.
- Reine Hortense, gros fruit, à longue queue; excell. mais peu fructifère.
- Royal Duke, fr. mûr après le May Duke; excell.
- Werder's Early Black Heart, fruit de 1^{re} qualité, gros, hâtif.

N. B. Il sera fourni des greffes de ces variétés de Cerisiers aux prix de 25 centimes le rameau, et des multiplications de 1 à 3 francs le sujet, suivant la force des pieds et le degré de nouveauté.

Fraisiers.

En général, il faut au Fraisier un sol léger, riche et profond. Il doit être cultivé, non en plates-bandes, comme on le fait encore en tant d'endroits, mais en planches et dans la partie du jardin potager la mieux exposée au soleil. On le plante en octobre ou en mars, à 0^m,25 et 0^m,50 de distance en tous sens. Ces plantations ne donnent un résultat complet que la seconde et la troisième année : elles durent 4 ou même 5 années consécutives. Il est indispensable de replanter dans un autre endroit du jardin au moyen de jeunes coulants, dans un sol bien fumé et labouré profondément. De copieux arrosements, en temps de sécheresse, vers la fin d'avril et au commencement de mai, faits, non pas le soir, mais le matin, et en plein soleil, contribuent beaucoup à développer le fruit et à faire produire une récolte abondante. On cueille le fruit de bon matin, au moyen de petits ciseaux bien affilés, en lui laissant un petit bout de tige; le fruit se lave, sans qu'on enlève celle-ci. De cette manière, il se conserve mieux et retient son arôme jusqu'au moment même où il est servi sur table.

L'usage de pailler le sol ou d'y placer de la mousse, pour que la terre ne salisse pas le fruit, offre plusieurs inconvénients. Sous cette paille, en effet, comme sous cette mousse, viennent se réfugier tous les insectes du jardin, qui endommagent ou détruisent une partie de la récolte. De plus, ce paillis empêche les rayons solaires de tomber directement sur le sol et de communiquer au fruit ce degré de maturité et cette saveur, ce goût exquis propres à son espèce.

- | | |
|---|--|
| <p>Aigburt's Seedling. Fruit gros, un peu arrondi, d'un goût relevé; la plante prod. abond. dès la 2^e année après la plantation.</p> <p>Annette (Salter). Fr. gr., allongé et pointu à l'extrémité, de bon goût et abondant.</p> <p>* Athlète (Salter). Fr. gr., d'une forme différente des autres, plus aplati, goût vineux, relevé.</p> <p>Australie (Salter). Fr. gr., all. et aplati vers le bout, de bon goût, assez abondant.</p> <p>Elcton White ou Barne's large White. Fr. gr., presque arrondi, large, d'un goût de melon, très-abondant et hâtif.</p> <p>Black prince (Cuthill). Fr. moyen, rond, rouge-écarlate, goût relevé; feuillage étroit, mince; variété très-hâtive et productive.</p> <p>Comte de Paris (Pelvillain). Fr. arrondi, gr., de bonne saveur; mûr vers la mi-juin.</p> <p>Comtesse de Marne. Très-précoce, bon fruit, abondant.</p> <p>— Zamoiska. Fr. gr., allongé, goût relevé, hâtif.</p> <p>Deptford Pine (Myatt). Fr. gr., arrondi, chair serrée, très-bonne; variété peu productive.</p> <p>Duchesse de Trévise. Fr. gr., allongé, hâtif, de bon goût.</p> <p>Eleanor (Myatt). Fr. très-gr., de forme</p> | <p>allongée, peu coloré, de bon goût, très-productif. — Bonne sorte à forcer; le fruit, cultivé en pot dans la serre, obtient un meilleur goût.</p> <p>Eliza (Myatt). Fr. gr., un peu allongé, d'un goût relevé, hâtif et fort abondant. Depuis cinq ans, le fruit a mûri, dans notre jardin, du 10 au 20 mai.</p> <p>Globe (Myatt). Fr. gr. ou moyen, de formes diverses, d'un goût peu relevé, assez abondant, mûr du 10 au 25 juin.</p> <p>* Hendry's Seedling. Fr. de belle forme, allongé, de goût relevé, d'une maturité tardive, fin de juin.</p> <p>Hooper's Seedling. Fr. gr., peu coloré, d'un goût relevé.</p> <p>Imperial Bath. Fr. très-gr., de bon goût, à côtes saillantes, à graines profondément rentrées dans le fruit.</p> <p>* Kitley's Goliath. Gr. et bon fruit, très-productif.</p> <p>Nainette (Loric). Gr. et bon fruit.</p> <p>Patrick's Seedling. Beau et gr. fruit, de forme allongée, très-coloré, d'un goût relevé; abondant et hâtif.</p> <p>Prémices de Bagnolet (Graindor). Par ses larges feuilles velues et par ses gr. fruits, cette variété nouvelle se distingue parmi tous les fraisiers. Fr. très-gr., de forme arrondie, peu coloré, d'un goût excellent.</p> |
|---|--|

- maturité plus tardive que celle des grosses variétés anglaises.
- Perpétuelle de St-Gilles. Le fruit en est plus gr. que celui des autres perpétuelles, et le goût en est plus relevé. Pour donner à cette variété ses bonnes qualités, on la replante à chaque printemps. Le fruit n'a toute sa saveur qu'aux mois d'août, de septembre et d'octobre. Les coulants terreautés donnent le fruit le plus beau, le plus délicat.
- Prince Albert (Myatt). Très-beau fr. de forme allongée et d'un goût délicat; variété hâtive, mais peu abondante.
- * Prince Arthur (Wilmot). Gr. et excellent fruit, de bonne consistance, mûrissant tard, nouveauté très-distinguée.
- Princesse royale (Pelvillain). Fr. très-gr.
- et un peu allongé; var. hâtive, productive et très-bonne.
- * Prolific (Myatt). Fr. gr., très-bon, espèce productive.
- * Queen Victoria (Myatt). Très-gr. fruit, arr., de bon goût, assez productif.
- Royal Pine. Beau fruit, d'un goût relevé, productif.
- * Stirling Castle. Très-gr. fr., abondant.
- Swainston's Seedling. Fruit rouge, pâle, ass. gr., très-hâtif et de bon goût; var. très-productive et constante.
- Thom's Seedling. Fr. moyen, bon, mais peu étudié.
- * Versaillaise (la) (Salter). Fr. allongé, peu coloré, du goût de la framboise; une des meilleures variétés.
- Wilmot's Superb. Fruit déjà ancien, très-bon et très-beau; variété des plus productives et mûrissant la dernière; très-constante.

Les variétés non précédées d'un astérisque (*) seront fournies :

25 pour 1 fr.; — 50, 2 fr.; — 100, 5 fr.

Celles qui sont précédées d'un astérisque, au prix de :

12 pour 1 fr.; — 25, 2 fr.; — 50, 5 fr.

Nouveautés de Fraisières.

Parmi nos semis faits, ces dernières années, nous avons remarqué certaines variétés offrant des qualités particulières, sous le rapport de la forme et de la saveur des fruits, sous celui surtout de l'abondance de ces fruits, du port et de la rusticité des plantes. En les comparant aux variétés de notre collection, nous avons cru pouvoir les considérer comme des perfectionnements et les offrir comme tels, en toute confiance, aux amateurs. Nous rembourserons le prix d'achat aux acquéreurs qui, après deux années de culture, ne trouveraient pas nos descriptions conformes aux produits.

- Choix du connaisseur. Fruit gros, plutôt court que long, bien conformé, d'un beau rouge-cerise; saveur agréable, goût relevé vineux. Variété très-fructifère.
- Belle de Bruxelles. Très-gros fruit rouge, bien conformé, un peu allongé. Goût agréable et prononcé. Var. très-productive.
- La perle des Fraises. Fruit très-gros, rouge carmin, plutôt court que long. Excellente saveur et très-fructifère.
- Nec plus ultra. Fruit énorme, rond ou triangulaire et aplati à sa base, d'un beau rouge-cerise. La saveur en est des plus agréables. Variété très-vigoureuse et productive.
- Reine des Fraises. Fruit très-gros, allongé, blanc rosé. Saveur délicieuse. Var. vigoureuse donnant des fruits en abondance.

L'époque de la maturité de ces cinq variétés nouvelles de Fraisières a lieu du 10 au 25 juin.

Ces cinq variétés seront émises au mois de mars prochain, au prix d'un franc par coulant enraciné et au choix du preneur.

Par douzaine au prix de 10 francs.

Framboisiers.

Bifère 12 plantes pour 3 fr.

Syn. : *Perpetual bearing, Large fruited mounthly, Quatre Saisons.*

Cette variété porte en effet deux fois l'an, au mois de juillet et en septembre-octobre. Le fruit, rouge, de forme arr., a un goût relevé.

Blanche nouvelle (Cookson).

6 pieds pour 5 fr.

Cette nouvelle variété se distingue par son feuillage, par sa croissance et surtout par son fruit très-gros, abondant, d'un blanc jaunâtre et d'un goût excellent.

Chilienne ou du Chili. 12 pl. pour 5 fr.

Moins vigoureuse que les autres sortes,

celle-ci porte en abondance des fruits dont le goût est supérieur à celui de toutes les autres variétés.

Falstoff 12 pl. pour 3 fr.

Cette variété, très vigoureuse, a de gros fruits rouges, dont le goût ressemble beaucoup à celui de la variété connue chez nous sous le nom de Grosse variété de Hollande.

Jaune d'Anvers. 12 pl. pour 1 fr.

Variété vigoureuse à fruit plutôt blanc que jaune, dont la grosseur et le goût sont inférieurs à ceux de la Blanche nouvelle de Cookson.

Grossilliers à grappes.

La Belle de St-Gilles. Sera annoncée ultérieurement.

Blanc Cristal, à très-gros fruit	1	plante pour.	fr.	50
— à gros fruit rouge	1	—	—	50
Queen Victoria	1	—	—	50
Cassis, noir ordinaire	6	—	—	2 n
— de Naples, à très gros fruit	6	—	—	3 n
— à fruit gris	1	—	—	50

Grossilliers à Maquereaux.

(Variétés anglaises à très-gros fruits.)

A fruits rouges.

Companion.
Commandor.
Coronation.
Crown bob.
Echo.
Georges IV.
Glorious.
Guido.
Premier.
Roaring Leon.

Wonderful

A fruits blancs.

Cheshire Lass.
Eagle.
Swan.

A fruits jaunes.

Fearfull.
Golden Crown.

Gunner. Invincible.

A fruits verts.

Bang Europe.
— Down.
Favourite.
Green mantel.
— prince.
Keepsake.
Providence.

6 plantes, au choix, de 2 à 5 fr., suivant la force des sujets.
12 — — de 3 à 10 fr., — —

POIRIERS.

Nous offrons aux amateurs et aux pépiniéristes les greffes des poiriers de notre école, dont les plantes-mères sont très-robustes et dont l'identité nous paraît certaine. Pour répondre d'avance aux questions que l'on pourrait nous adresser, nous donnons, à la suite de chaque variété ancienne ou nouvelle et suffisamment étudiée, des indications succinctes sur la forme du fruit et sur l'époque approximative de sa maturité, sur sa culture en espalier, en pyramide ou en haut-vent. Il est fort difficile de formuler des règles générales sur la culture du poirier et celle de ses nombreuses et intéressantes variétés. Ce serait sans doute un travail fort utile à consulter qu'une monographie spéciale donnant des indications particulières sur chaque variété dans les terrains différents, sous divers climats, sur coing ou sur franc, sur aubépine ou sur sorbier, ou bien en espalier, en pyramide et en haut-vent aux diverses expositions. Il est au moins fort douteux qu'une œuvre de ce genre puisse être achevée de sitôt; en effet, chaque praticien considère la question sous le point de vue particulier de son jardin ou de sa pépinière. C'est ainsi qu'ont été publiés plusieurs traités où les auteurs ont exposé les résultats de leurs expériences, d'après des faits constatés dans certaines localités, mais dont l'application suivie dans d'autres climats et sur un sol différent est loin d'avoir répondu à l'attente de l'observateur judicieux et attentif. Il y a sans doute de l'utilité à retirer de l'étude de ces divers traités; mais la mise en pratique des principes établis nous a convaincu, depuis nombre d'années, que l'on ne peut avoir recours à ces indications qu'à simple titre de renseignement.

Avant d'exécuter une plantation de poiriers, il est indispensable d'examiner la nature du sol, sa profondeur, l'exposition du jardin ou du verger, enfin le climat sous lequel ils sont placés. Si l'on veut faire des plantations pour haut-vent, pour pyramide ou pour espalier, dans un terrain dont le sol est composé en grande partie de terre glaise peu marnée, il est certain que les arbres sur franc, cultivés en pyramide ou en espalier, se développent en général avec trop de vigueur et sont lents à porter des fruits. Pour ce sol, il faut donc des arbres sur coing, et cela n'offre aucun inconvénient pour l'espalier. Cependant, pour les pyramides, il en est un permanent. Le coing forme des racines de peu de consistance dans la terre; l'arbre cède aux vents forts, s'il n'est soutenu par un bon tuteur, et l'on connaît les inconvénients de l'emploi des appuis. S'il se détache de ses liens, le tuteur occasionne des plaies aux branches et aux rameaux des pyramides; il s'y forme des nids d'insectes difficiles à enlever. Les plaies produisent des cancers qui détruisent, par l'action corrosive des insectes, les rameaux les plus forts, et défigurent ainsi, en peu de temps, une belle pyramide qui a exigé souvent quinze à vingt années de soins et de travaux. Pour éviter ces désagréments et amener les poiriers à jouir d'une vigueur pleine et entière, il faut, selon nous, donner la préférence aux arbres sur franc obtenus de pépins; cependant on doit toujours préférer, mais bien entendu pour un sol gras et fort, les variétés dont le bois n'est pas trop vigoureux dans sa croissance. Il en est un grand nombre dans les variétés à fruits délicats. On réserve pour le haut-vent les espèces qui ont le plus de vigueur et forment un bois gros et court.

Dans un sol léger et profond, avec une exposition aérée, il est également certain, qu'à peu d'exceptions près, toutes les variétés réussiront sur franc, pour pyramides comme pour haut-vent.

Si le franc conduit en espalier s'emporte trop, on a recours à la taille des racines pour maintenir l'équilibre et pour forcer l'arbre à fructifier.

Au reste, lors de la taille, on a soin, pour ces trois formes, de laisser aux variétés à végétation vigoureuse, les branches à fruits plus longues, et à celles d'une végétation moyenne, un bois plus raccourci.

C'est une erreur de croire, comme l'avance un ouvrage fort répandu, et d'ailleurs très-utile à consulter, que le fruit provenant sur coing soit meilleur que celui qui vient sur franc. On sait généralement, et plus d'une fois nous l'avons observé, que plusieurs variétés de poiriers, cultivées sur coing et en espalier au couchant, produisent des fruits plus beaux que le franc en pyramide ou en haut-vent. Jusqu'ici,

cependant, il n'a point été démontré, en Belgique, que ces fruits fussent de meilleur goût.

Telles sont, selon nous, les seules indications générales applicables à nos climats.

A aucune époque antérieure, l'horticulture n'a été en possession d'une nomenclature plus riche en beaux et bons fruits de poiriers. Le plus grand nombre a été obtenu de semis en Belgique, depuis un demi-siècle seulement. Les autres sont originaires de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre et de l'Amérique du Nord. Dans ces diverses contrées, il y a une grande confusion dans les dénominations, et tous les ans il s'y fait plusieurs synonymies très-regrettables. Dans les fruits anciens d'où proviennent les variétés nouvelles, il y a des noms désignant des formes applicables également aux fruits nouveaux. Ces dénominations, généralement adoptées, sont au nombre de huit :

1° La forme Bergamote; 2° celle de la Besi; 3° du Bon-Chrétien; 4° forme de Calebasse; 5° Colmar; 6° Doyenné; 7° Rousselet et 8° St-Germain.

Nous excluons les Beurrés, car on ne peut appliquer cette dénomination à une forme particulière, et l'on trouve aujourd'hui le goût du beurré dans des variétés offrant plusieurs formes distinctes.

En classant ainsi tous les fruits sous ces huit dénominations de formes, on simplifierait beaucoup l'étude des poires qui, aujourd'hui encore, paraît assez embrouillée.

Depuis dix ans, nous nous occupons à réunir les éléments de ce travail. Aujourd'hui que notre école offre des sujets de toutes les meilleures poires introduites dans les cultures, nous espérons pouvoir mener nos études à bonne fin et en faire connaître aux amateurs les résultats principaux par la voie de la presse.

N. B. Dès à présent nous croyons devoir prévenir nos amis et nos correspondants que feu le professeur Van Mons ayant envoyé, de 1820 à 1850, des greffes de ces poires nouvelles de cette époque, sans noms et seulement avec des numéros, à M. Oberdick, intendant en chef à Neuburg sur le Weser, celui-ci en envoya, de son côté, des greffes à ses amis. D'après une publication faite à ce sujet, sous le titre de *Description de fruits nouveaux*, par le Dr LIECHT, imprimée à Regensburg, 1851, plusieurs fruits belges ont reçu, en Bavière, un nom différent des nôtres. Le rédacteur aurait pu éviter cette nouvelle confusion, en soumettant les numéros de ces fruits à M. Bivort, qui se trouve en possession de la pépinière et des annotations de l'ancien professeur de Louvain.

Comme nous avons aujourd'hui dans notre collection un grand nombre de ces poires, nous ferons en temps et lieu les confrontations nécessaires pour les reconnaître et nous en publierons la synonymie, à l'effet d'épargner aux amateurs toute méprise ou toute confusion ultérieure.

Voici quelques-unes de ces dénominations :

Bettina.	Beurré Dietrich.	Pépin Théodore.
Beurré d'auto ^{re} de Liegel.	— d'Oberdick.	Poire Salis.
— — de Donauer.	Eugène Fürst.	Saint-Augustin.
— Badich.	Marie Stuart.	Schmidberger.

Collection de Poiriers.

ABBREVIATIONS :

f., fertile; — exp., exposition; — gr., gros; — ass., assez; — tr., très; — fr., fruit; — fd., foudant; — moy., moyen; — q., qualité; — F., sur franc; — C., sur coing — pyr., pyramide; — vig., vigoureux; — h. v., haut-vent; — esp., espalier; — ch., chair; — t., table.

Les renseignements monographiques sont beaucoup plus complets dans ce Catalogue que dans celui que nous avons publié en septembre 1850 et en février 1855.

Depuis cette époque, nous avons recueilli de nombreuses indications sur certaines variétés nouvelles, que nous avons étudiées spécialement.

En indiquant les époques de maturité des fruits, nous devons prévenir le lecteur qu'on ne peut considérer ces renseignements que comme approximatifs. En effet, il est reconnu, en ce qui concerne les fruits nouveaux en particulier, que leur époque de maturité n'est pas encore bien fixée. Elle dépend, en général, beaucoup de la qualité du sol, des années plus ou moins favorables, de l'époque de la cueille et aussi de l'influence du sujet sur la greffe. Ce dernier point est contesté par certains pomologues; mais un grand nombre de praticiens conviennent que cette influence existe en réalité et se fait ressentir sur l'époque de maturité du fruit.

- Abbé Édouard (Bivort), fruit moy. fd. 1 q. mûr en nov. F. C.
- Adèle de St-Denis, 1 q. bonne poire, fd. mûr en oct. C. pyr.
- Aglé Grégoire, 1 q. hiver.
- Alexandre Lambré (Bivort), 1 q. excell. poire, fd. moy. belle pyr. C. nov.-mars.
- Alexandrine Hélie (Van Mons), moy. fond. 1 q. nov.
- Alexandrina (Bivort), fr. ass. gr. 1 q. mûr comm. de sept. F. C.
- Alphonse Karr, gr. fd. nov.
- Ambrosia, genre de beurré hâtif.
- Angélique nouvelle de Bordeaux, fr. gr. pyr. fd., beurré, mûr avril et mai; arbre assez vig. pour esp. et pyr. F. à exp. chaude.
- Arbre courbé (V. M.), fr. fd. 1 q. oct.-nov.
- Archiduc Charles, bon. fr. de conserve.
- Aston town, fr. moy. mûr oct. et nov. peu vig. F. pyr.
- Beau présent d'Artois (syn. *Présent royal de Naples*), fr. gr. all. mi-fd. mûr sept., vig. f. pour pyr. et h. v.
- Belle de Féron, fr. tr.-gros. mi-fd., mûr oct. et nov., vig. pyr. esp.
- des Forêts, fr. petit, fd., mûr fin sept. et oct., vig. f. pour pyr. et h. v.
- Julie (V. M.), fr. petit, ovale-obt., fd., mûr oct., vig. f. F. pour pyr.
- Bergamote (Esperen), moy. fd., févr.-mars.
- Boussière.
- crésane d'automne, fr. gr. arr. fd. mûr. oct. et nov., vig. f. esp. pyr.
- crésane d'hiver, fr. gr. fd., mûr déc. et janv., vig. f. pyr. esp.
- de Louvain (V. M.). Pet. fd. 1 q. nov.
- d'Esperen (Esperen). Arb. assez vig. et fert. sur cogn. et sur fr. pour pyr. et à l'espal. Fr. fd. parf. presque rond, de 1 q. mûr fév.-avril.
- d'été, fr. pet. arr. mûr sept.-oct., peu vig. f. sit. ch. sous sol un peu hum. esp. pyr. et h. v.
- Bergamote de Pâques, fr. gr. arr. mi-fd., turbiné, mûr janv.-mars et f. esp. pyr.
- Dussart (D. de Jodoigne), moy. fd. déc.-févr., C. pyr. h. v.
- Fievez (F. de Maubeuge), beau fr. de conserve.
- Gansel, 1 q. magnif. poire; expos. ch. au sud; C. pyr.
- rouge tardive (V. M.), fr. non complet. obs. jusqu'ici; a porté la première fois en 1858.
- Sageret, fr. moy. fd., mûr en nov.-déc., vig. pyr. h. v.
- Soldat (Esperen), fr. moy. ovale, turbiné, fd., mûr fin d'oct. et nov., vig. f. pyr. et h. v.
- Besi de Chassery, fr. moy. ov. obt. fd., mûr de nov. à janv., vig. moy. tôt à fruit, pyr. esp.
- de Chaumontel, gr. mi-fd. 1 q., généralement connu.
- — panaché, 2 q. fr. pet., mûr déc.-janv.
- d'hiver.
- De la Motte, moy., 1 q., nov.
- de Louvain (V. M.), fr. bon et beau, mûr en oct. et nov., vig., belle pyr. F. sol léger et prof.
- de Montigny, fr. moy., turb. fd., mûr en oct., vig. moy. f. Dans un sol léger et ch. pyr. et h. v.
- du printemps (Bouvier), moy. fd., 2 q., févr.
- des Vétérans (V. M.), fr. gr. turb. fd., mûr en nov., vig. F. esp. pyr. h. v.
- de Vindré, pet. exq. fd., mûr sept. et oct., peu vig. f. F. pyr. h. v.
- tardive.
- de St-Yvaast, sur franc, pour pyr. bois à fr. tôt, fd., gros apl. si l'arbre est vig.; fr. de belle forme.
- Beurré anglais ou Poire de St-Omer.
- Antoinette (Bivort), fr. moy. fd., mûr oct. et nov., vig. moy. fert., pyr. esp.

- Beurré Beauchamps, fr. moy. turb. arr. fd., mûr en nov., vig. f. h. v. pyr. esp.
- Beaumont, moy. fd., déc.-fév.
- Bennert (Bivort), fr. moy., fd., mûr en janv.-fév., vig. f. pyr. et h. v.
- Berckmans (Bivort), fr. moy. pyrif. renflé au c. rétr. au péd. ch. bl. sucr. vin. nov.-déc., vig. pyr. h. v.
- Biémont, fr. moy. turb., fd. mûr en nov., vig. h. v. pyr. esp.
- blanc des Capucins, fr. gr. ov. ventru, fd., sept.-oct., arb. moy. pyr. esp.
- Bosc (V. M.), fr. gr. pyr. fd., oct.-nov., vig. h. v. pyr. esp.
- Bretonneau (Espereu), fr. gr. ov. pyr. turb. forme var. janv. et mars, F. vig. f. h. v. pyr. esp.
- Brougham Hal (Knight), 1 q. ch. f. mûr en nov.
- Burnicq (Esp.). Fr. moy. obl. fond., oct.-nov., pyr.
- Capiaumont. Fr. moy., pyrif. fd. en oct., vig. éc. noir, h. v. pyr.
- Clairgeau. Fr. tr. gr. all. ch. fd. nov.-déc., vig. et f. esp. et pyr. et h. v. J'ai obtenu sur une jeune multiplication de trois ans un fruit pesant 520 grammes.
- Coiet. Fr. pet. ou moyen, délicieux, mûr en mars ou avril, pl. v., pyr. ou esp.
- Copretz.
- Crapeau.
- Curtet (V. M.). Fr. pet. ou moy., quasi rond, côtelé, oct., vig. F. pyr. h. v.
- d'Amanlis (V. M.) Fr. fd. gr. ov. turb. mûr en sept.-oct., vig. et f., sol léger prof. h. v. pyr.
- — panaché. Fr. très-hâtif.
- d'Amboise ou gris. D'hiver.
- d'Angleterre (noisette).
- d'Arenberg (Dechamps). (Syn. Orph. d'Enghien.) Fr. fd. F. pyr. sol lég. et prof., var. vig. fr. gr. renflé au c. turb. nov.
- de Fais. 1 q. fd. rob. belle pyr. C.
- d'Hardenpont (Syn. Glou-morceau, friand). f. fd. gr. pyr. bosselé vers l'œil, nov.-janv. en sol lég. prof. exc. et beaux fr., ne souffre pas la taille en h. v.
- De Hemptinne (V. M.). Fr. moy. mûr en nov., vig. f. pyr. et h. v.
- De Koning. Fr. gr. fd. mûr en nov., vig. f. pyr. h. v.
- Beurré d'Enghien. (V. M.). (Syn. Duc d'Enghien). Fr. moy., b. forme, unicol. fr. de t. exq, sept.
- des Béguines. Moy. 2 q.
- d'River (Rivers). Fr. gr. fd. vineux, mûr de fév. en mars.
- de Raus. fr. fd. var. de forme et dim., mûr nov.-avril.
- de Ronineau. Mûr en nov.
- de Wetteren (Berckmans). Moy. fd. 1 q. hiver.
- Diel. (Syn. Incomparable, Magnifique). Fr. tr.-gr. turb. pyrif. fd. parf. mûr de nov. à janv. F. pyr. vig. f. h. v. sol lég. prof.
- doré. Fr. moy. fd., oct.-nov., peu vig. f. pyr. esp.
- douce saveur (V. M.) Pet. fd. 2 q., fév.-mars.
- Drapiez. Moy. fd. exq. nov.
- Dumou - Dumortier (Stas). Gr. fd. 1 q., mûr déc.-janv.
- Duval. Fr. gr. all. fond. oct.-nov., vig. f. pyr. et h. v.
- Englebert. Fr. gr. mi-cass. mûr déc.-janv., vig. f. pyr. h. v.
- Gens (V. M.) Fr. gr. all. pyrif. fd., mûr fin sept., vig. f. pyr. h. v.
- Giffare. fr. moy. turb. fd. mûr fin juillet; vig. f. esp. pyr. h. v.
- God (God). Fr. moy. fd. ch. bl., mûr en déc.; très-fert.
- Goubault. Fr. moy. arr. turb. mi-fd. mûr sept., vig. f. pyr. h. v.
- gris d'hiver supérieur (Syn. B. de Luçon). Fr. gr. fd. mûr janv., peu vig. tr.-f. esp. pyr. F. sol lég. prof.
- Hamacker (Bivort). Moy. gr. fd. exq. vin. nov., var. assez vig. F. pyr. sol léger.
- Kennes. Assez gr. turb. fd., 1 q., oct.-nov.; ass. vig. tr.-f. esp. pyr.
- Lefebvre (Syn. de la Morte-Fontaine). Fr. gr. ov. fd., mûr en oct., vig. f. pour pyr. sujet à se gercer en terre forte.
- Lengelier. 1 q., excel. fr. fd. C. pyr. déc.
- Moiré. Fr. gr. exc., mûr oct.-nov., assez vig. pyr.
- Nantais. Fr. moy., mûr oct.
- Scheidweiler (V. M.). Fr. gr. fd., mûr fin d'oct., vig. f. pyr. h. v.
- Six. Gr. tardif.
- Stappaerts (V. M.). Fr. pet. mi-fd., mûr janv. - avril, vig. f. pyr. h. v.

- Beurré Sterkmans. Fr. gr. fd., mûr en déc.-fév., vig. f. pyr. h. v.
 — superfin (Goubault). Fr. moy. fd., mûr fin sept., peu vig. pyr. h. v. Syn. Cumberland.
 — tardif d'automne (G. Liegel).
 Beymont (Bouvier). Fév.-mars, gr. fd., 1 q. Bishop's Thumb.
 Bô de la Cour.
 Bois Napoléon (V. M.). Fr. gr. fd., mûr en oct., vig. pyr.
 Bon-Christien d'Enghien.
 — — fondante d'hiver.
 — — Napoléon (Liard de Mons). Peu vig. même F. en sol léger, à tailler court en pyr. var. f. en fr. fd. vin. se cons. d'oct.-nov.
 — — Williams (Davis W.) (Weeler Berkshire). 1 q. tr.-gr. fd. sept.
 — Gustave (Berckmans).
 — Parent (Bouvier). Pet. exq.
 Bonne d'Ézéc (Dupuy Jamain). Fr. gr. fd. mûr en sept., vig. F. pyr.
 Brandes St-Germain (M. V.)
 Broome Park (Knight). Fr. moy. fd. goût d'Ananas, mûr en sept., ass. vig., f. h. v. pyr.
 Bouvier Bourgmestre (Bouvier). Fr. gr. fd., mûr en nov., arbre épin. vig. pyr. h. v. esp. surtout.
 Calebasse Bosc (V. M.). Fr. gr. pyr. mi-fd., oct., peu vig. f. var. F. en sol léger, chaud.
 — Tougard (Bivort). Fr. moy. ou gr. chair beurrée, fd., mûr oct.-nov., vig. f. pyr. esp.
 Capucine Van Mons (Bouvier). Fr. moy. tardif très-vig.
 Cassante de Mars (Esperen). Fr. moy., turb. cass. musqué, mûr en mars-avril, arb. moy. F. pyr. esp.
 Catinka (Esp.). Moy. ov. turb. fd., oct.-nov., 1 q., C. mûr grad. vig. f. esp. h. v. pyr.
 Charles Durieux (V. M.). Fr. ov. fd., mûr en nov., vig. F. pyr. h. v.
 — Smet (V. M.). Moy. fd., déc., assez vig. pyr. h. v. esp. surt.
 — Van Hoogten (V. M.).
 Charlotte de Brouwer (Esp.). Moy. mi-fd., 1 ou 2 q., oct.
 Choix d'un amateur (V. M.). Fr. gr. fd., mûr nov.-déc., vig. pyr. h. v.
 Clémence (Fruit de la forme d'un Boyenné). Beurré anglais?
 Colmar Artoisenet. Fr. tr.-gr., fd., mûr fin d'oct., vig. moy. pyr. esp.
 — Charnet.
 Colmar d'Arcenberg (V. M.). Arbre vig., F. en sol léger, f. en pyr. esp., fr. turbinif. fd. musqué.
 — De Meester.
 — De Metz. Fr. moy. mi-fd., mûr déc. vig. pour pyr.
 — Josse Smet (V. M.). Fr. d'hiver, 1 q., vig. pyr. h. v.
 — Nelis (à Malines) (Syn. Nelis d'hiver). Fr. moy. fd. mûr déc.-janv., peu vig. f. pyr. esp.
 — Van Mons (Duquesne). Fr. gr. fd., nov.-déc.
 Comte de Flandre (V. M.). Fr. gr. fd. exc. mûr nov.-déc. tr.-vig. f. pyr. tr.-belle et h. v.
 — de Paris (Bivort). Gr. fd. exq., oct.
 — Lamy. Fr. moy. mi-fd. parf. mûr en nov. F. belle pyr.
 Cops heat (V. M.). Fr. fd. turb. oct.-nov. vig. f. pyr., h. v. surtout.
 Crésane (Althorp). 1 q. nouv. et forte var. mais un peu incert. 2 q. en certains sols, C. nov.
 — new (nouvelle) Edgewood's.
 Cumberland (V. M.). Fr. tr.-gr. fond. mûr oct. vig. F. pyr.
 Cette variété paraît avoir reçu le nom de Beurré superfin à une date plus récente.
 Dédicace, fr. moy. arr. mûr en octobre fond. vin. parf. du goût de fleur d'oranger vig. moy. pr. pyr.
 De Lamartine (Bivort). F. moy. fond. beurré, mûr en février, vig. F. pyr.
 Délices de Charles (Bouvier). A. de vig. moy. ass. fert. pyr. esp. fr., moy., ch. fd. 1 q. mûr mars.
 — de Jodoigne. Fr. moy. fond. mûr oct. peu vig. fert. F. pyr. h. v.
 — de la Meuse. Gr. mars.
 — de Louvenjoul (V. M.). Fr. tr.-gr. fd. mûr nov.-déc. vig. f. esp. pyr. et h. v.
 — d'Hardenpont. Fr. gr. turb. rétr. au péd. mûr nov.-déc. peu vig. ass. fert. F. pyr., mieux en esp.
 — d'Angers. Moy. fd. 1 q. oct.-nov.
 Dengler ou d'Ingler. Moy. fd. nov.
 Désiré Cornélis (Bivort). Fr. moy. fd. mûr en août et sept.
 — Van Mons (V. M.). Fr. gr. fd. mûr fin sept. et oct. vig. tr.-fert. pyr. h. v.
 De Sorlus (V. M.). Fr. g. fd. mûr nov. vig. fert. pyr. h. v.
 D^r Bouvier (V. M.). Fr. moy. pyr. turb. fd. mûr janv.-mars, vig. f. pyr. h. v.

D^r Capron (V. M.) Fr. gr. ov. fd. mûr nov. vig. F. esp. pyr.
 D^r Trouseau (Bivort). Gr. fd. exq. nov. déc. très-vigoureux.
 Doyen Dillen (V. M.). Fr. gr. ov. fd. mûr déc. vig. F. esp. et pyr.
 Doyenné croûté. Fr. moy. fd. beurré, mûr oct.-nov. F. pyr. esp.
 — d'Alençon. Moy. fd. déc.-janv.
 — d'hiver (Syn. Canning, Pastorale, Bergamote de Pentecôte). Fr. tr.-gr. ov. fd. mûr décembre à février, arbre moy. tr.-fert. pour pyr. et esp. Fr. et C. sol fort et argileux, exp. ch.
 — Goubault. Fr. gr. belle poire, fd. mûre fév.-mars, vig. fert. pyr.
 — Sentelet (V. M.). Fr. moy. fd. beurré, mûr nov. ass. vig. pyr. h. v. esp. très-bonne variété nouvelle.
 — Sieulle. Fr. pet. ou moy. fd. mûr oct.-déc. vig. fert. pyr. h. v. esp.
 — d'automne (Liegel). Moy. fd. exq. nov.
 — de Bruxelles (De Jonghe). Var. nouvelle. Sera ultérieurement mise dans le commerce.
 Duc de Bordeaux. (Syn. Belle épine Dumas.) Fr. moy. turb. ou ventru, mûr, nov. vig. fort. F. belle pyr.
 — de Brabant (V. M.) Fr. gr. all. ventru, mûr nov. vig. ass. fert. F. pyr.
 — de Brabant (Millet). Fr. tr.-gr. pyr. bon, mûr mai, tr.-vig. fert. pyr. et esp.
 — de Nemours (V. M.). Fr. moy. pyrif. fd. mûr nov. ass. vig. F. pyr.
 — d'Orléans (Bivort) Fr. gr. fd. 1 q. mûr nov.-déc. F. C.
 Duchesse d'Angoulême (Audusson). Fr. tr.-gr. obt. ou turb. mûr de nov. à janv. et esp. fert. F. pyr.
 — panachée. Bois strié, arb. vig. f., mûr en nov.-janv.
 Durocher. Poire de conserve.
 Egg Swan.
 Eliza d'Heyst (Esp.). Fr. gr. fd. mûr de mars à avr. vig. moy. pour esp. à l'E. F. pyr. en bonne exp.
 Emile d'Heyst. Fr. gr. all. fd. mûr oct. vig. esp. pyr. h. v.
 Emilie Bivort (Bouvier). Arb. ass. vig. pyr. h. v. fr. moy. fd., musqué, 1 q. mûr nov.
 Enfant prodigue (V. M.) Fr. moy. turb. fd. mûr janv.-fév. vig. fert. pyr. h. v. dans un sol chaud.

Épine d'hiver. Fr. moy. all. pyrif. fd. mûr nov.-janv. vig. F. sol lég. prof. pyr. h. v.
 — Dumas ou Belle épine Dumas (Syn. Duc de Bordeaux).
 Esmerald. Gr. fr. de table, mûr en nov. et déc.
 Esperine (V. M.) Fr. allongé fd. 1 q. oct. Ferdinand De Meester. Fr. ass. gr. fd. ventru, mûr oct.-nov., arb. moy. esp. pyr.
 Figue d'Alençon (Syn. Poire Figue). Fr. gr. ou moy. pyr. mûr sept. vig. pyr. h. v.
 Fondante des bois (Syn. Beurré des bois). Fond. sept.-oct. vig. pyr. h. v.
 — de Malines (Esp.). Fr. ass. gr. fd. mûr oct.-nov., arb. tr. vig. ass. f. belle pyr. F., sol léger.
 — de Noël (Syn. Belle après Noël). fr. pet. ou moy. fd. mûr déc.-janv., vig. f. esp. pyr. h. v.
 Fondante des Célestines. Fr. d'hiver.
 — des prés (V. M.). Moy. fd. nov.
 Forelle ou Poire aux truites, orig. de Saxe. Fr. moy. ou pet. fd. mûr nov.-janv., vig. f. pyr. h. v.
 Forme de Bergamote. Fr. gr. fd. mûr nov., vig. pyr. h. v.
 — de Crésane. Fr. gr. fd., mûr nov.-déc., vig. f. F. pyr. h. v.
 Fortunée (Reumes) (Syn. F. Parment^r). Fr. moy. court. turb. fd. mûr de janv. en mai; arbre fert., surtout en esp.
 Fourcroy (V. M.). Janvier.
 Frédéric de Wurtemberg (V. M.). (Syn. Vermillon d'Espagne). Fr. gr. fd. mûr fin sept.-oct. F. pyr. délicat.
 — Leclercq (Berckmans). Fr. moy. fd. mûr nov., arb. vig. f. pyr. h. v.
 Gédéon Paridant (V. M.). Arb. vig. F., belle pyr., fr. non observé.
 Général Dutilleul. (Bivort). Fr. moy. beurré, fd., mûr fin de nov., vig. pour pyr. h. v.
 Gloire de Binche. (Gaudière) Fr. gr. ou tr.-gr.; prov. du B. d'Hardenpont; pour h. tige, pyr. ou esp.; F. ou C.; fr. tr.-beau, goût exquis; mûr en déc. ou en janv.
 Grande-Bretagne, d'hiver. (Syn. Bon-Christien d'Espagne). Fr. gr. turb. pyrif. obtus, mi-fd., mûr en déc. vig. F. ou pyr., mieux h. v.
 Grand Soleil (Esp.). Fr. moy. turb. mi-fd., mûr en déc. et mars, F. pyr. en sol lég. prof. tr.-f. par taille all. arbre délicat.

- Gros St-Michel (Gros-St-Remy).** Gr. fd. 1 q. nov. et déc.
- Gustave Bourgogne.** (V. M.). Fr. d'aut., arb. tr.-vig. pyr. h. v.
- Héliote Dundas.** Fr. moy. fd. musqué, mûr en oct., vig. moy. pyr. F.
- Henkel d'hiver** (V. M.). Fr. moy. fd., mûr janv., vig. pour pyr. h. v.
- Henri Bivort (Bivort).** Gr. fd. 1 q. sept.
- Henriette Bouvier (Bouv.).** Fr. moy. fd., mûr nov.-janv., vig. moy. tr.-f. esp. princip. pyr. F.
- Incomparable (Hacon).** Gr. fd., 1 q. nov.
- Jacquemin (Bouv.).** Fr. gr. mûr sept.-oct. vig. f. pyr. h. v. surt. pour verger.
- Jaminette** (V. M.). Syn. Doyenné ou Berg. d'hiver ou d'Austrasie ou Banneux (V. M.). Fr. moy. fd., mûr déc.-mars, vig. f. pyr. h. v.
- Jean De Wit (Witzthumb).** 1 q. délic. tard. fd. fév., F. et C.
- Joséphine Bouvier (Bouv.).** Fr. moy., mûr nov., vig. F. pyr.
- de Malines (Esp.). Fr. moy. ou pet. beurré, fd. mûr janv.-mars, vig. F. pyr. sol. lég. prof.
- Sous le climat de Belgique, cette variété mise à l'esp. produit des fruits plus gros du double, qu'en pyr. ou h. v.
- Jules Bivort (Biv.).** Gr. fd. exq. nov.
- Juteuse de Braunau (Liegel).**
- Jutte Peer** (V. M.). Moy. fd. 1 q. sept.
- La Juive** (Esp.). Moy. fd. 1 q. nov.
- La Moulinaise** (Grolez de Moulins-lez-Lille). Beau fr. forme de B.-Chr., mûr nov., vig. f. pyr.
- Léon Leclercq épineux** (V. M.). Fr. gr. mi-fd., mûr déc.-mars, vig. arb. fert. pyr. h. v. esp.
- — de Laval (L. L.).
- — Van Mons. Fr. gr. à ch. tendre, mûr de janv. en mai, vig. f. esp. pyr. h. v.
- Léopold 1^{er}** (Biv.). Gr. exq. fond. parfumé 1^{er} q. déc.-janv.
- Lewis ou Poire Lewis** (John Lewis in Roxbury). Sucre. fd. oct.-déc.
- Louise-Bonne, de Jersey.** 1 q. fd. exc. C. oct.
- Bosc. fr. fd. moy. oct.
- de Prusse (V. M.). Fr. gr. exq. fin d'oct. et nov. vig. f. esp. pyr. h. v.
- Louise** d'Orléans (V. M.). Fr. moy. tr.-fd., mûr nov., vig. F. belle pyr. h. v.
- Louis Grégoire** (Grég.). Fr. moy. fd. mûr d'oct. en déc., arb. vig. f. p^r pyr. et h. v.
- Lucien Leclercq** (V. M.). Fr. moy. fd. mûr oct.-nov., arb. vig. f. F. h. v. sol. lég. prof.
- Madame Eliza** (Biv.). Gr. fd. exq. nov.
- verte. Fr. all. ass. gr. tr.-fd. mûr déc., arb. vig. moy. pyr. F.
- Maréchal de Cour** (V. M.). Gr. fd. oct. et nov., arbre très-rustique pour pyr. et h. v. vient très-bien sur le cognassier.
- Marianne de Nancy.** Fr. moy. fd. sept.
- Marie-Louise (Duquesne).** Fr. gr. all. fd. mûr oct.-nov., arb. vig. moy. F. pyr.
- — nouv. var. (V. M.). Fr. gr. pyr. fd. mûr oct., arb. vig. tr.-f. F. pyr. et h. v. tient ses fruits contre les forts vents comme Louise-Bonne de Jersey.
- Miel de Waterloo.** Fr. moy. turb. fd. mûr oct.-nov., vig. F. belle pyr. sol. lég. prof.
- Millot de Nancy.** Fr. moy. ou pet. exc. mûr nov., vig. f. F. pyr. h. v.
- Monarch (Knight).** 1. q. forte, fd. exc. C. janv.
- Mg^r Affre** (Biv.). Fr. moy. ou gr. fd. mûr déc., vég. tr.-f. F. pyr. h. v.
- Musqué d'Esperen.** (Esp.).
- Ne plus Muris** (V. N.). (Syn. *Beurré d'Anjou*). Fr. gr. ov. fd. mûr nov.-janv., vig. pyr. h. v. sol. ch.
- Neuf-Maison** (V. M.). F. ass. gr. mûr nov., vig. moy. tr.-f. F. pyr.
- Niel** (V. M.). Fr. moy. fd. mûr sept.-oct., vig. et f. F. pyr. sol. lég. prof.
- Nouveau Poiteau** (V. M.). Fr. gr. fd. mûr nov., vig. f. pyr. h. v.
- Simon Bouvier (Bouv.). Fr. moy. mûr mars-avril, vig. pyr. h. v.
- Parfum de rose** (Biv.). Pet. fd. à odeur de rose.
- Passe-Colmar** (Hardenpont). Ass. connu.
- — d'été.
- — doré Fr. pl. gr. et col. que celui de la P. C., et arbre de même f. et cult.
- — musqué (Esp.). Fr. moy. ou gr. turb. mûr fin d'oct.-nov., vig. et f. F. belle pyr. sol. lég. prof.
- Paul Thielen** (V. M.). Gr. fd. 2 q. nov.
- Petit beurré** (Biv.). Fr. pet. exc. mûr nov., vig. f. F. pyr.
- Poire Alex. Bivort** (Berckmans). Fr. gros turb., quasi ov. ch. bl. rosée tr.-fine, eau abond., sucrée et parf. mûr janv., vig. pyr.
- Alphonse Karr (Berck.). Gr. fd. nov.

Poire Castelline.

- Chevalier de Saxe (Duttner).
- Dathis, du printemps.
- Davy (V. M.).

On considère en général cette variété comme synonyme de Fondante des Bois. Je possède dans mon école, sous le nom de Davy, une forte pyramide provenant de multiplication de la pépinière de V. M. à Louvain. Le fruit est gros, excellent, mûr en mars.

Poire d'automne, de Schöning.

- d'hiver, de Kaestner.
- de Liegel. Gr. et exc. fr. de t.
- de Louvain (V. M.). Fr. pet. ou moy. fd. mûr nov., vig. F. pyr. sol lég.
- de Maraise, fruit mûr en déc.
- des Chasseurs. Moy. fd. 1. q. nov.
- des deux Sœurs (Esp.). Gr. fd. 1 q.
- de Tongres (Syn. *Durondeau*, au village de Tongres, près d'Ath). fd. exq. nov.-déc.
- Dupuy Charles. Moy. fd. 1. q. nov.
- Fabvre, à Nantes.
- François.
- Gargainville (Forme de *Besi tardive*).
- Jacobs (V. M.). Gr. fd. août.
- Kartoffel (V. M.). Gr. fd. oct.
- Laure de Glymes, fr. ov. fd. sucré très-parfumé, 1 q. mûr en oct.-nov. Arbre fert. peu vig.
- Louis (V. M.). Fr. moy. fd. mûr. nov. vig. F. pyr.
- pêche (Syn. *Poire à longue queue*). Pet. arr. mûr août, moy. fd.
- Pie IX (Biv.). Fr. gr. pyrif. ch. fine, fd. mûr fin sept., vig. f. pyr. h. v.
- Prévost (Biv.). Fr. moy. ov. arr. fd., parf. mûr mars-avril, vig. moy. F. pyr.
- Président de Page, Gr. fd. oct.
- Van den Putte. Fr. all. fd. oct.

Présent Van Mons (V. M.). 1 q. mars.

Prince Albert (coll. v. Mons). Fruit gr. oviforme ou de celle d'un fort beurré de Rance, auquel son coloris ressemble. Chair d'un blanc jaunât., fine, demi-fond., demi-beurré, sucré, parfum du passe-colmar, mûr en févr. ou avril.

Cette variété est assez vig. pour pyr. et h. vent et elle réussit très-bien sur cognasier.

Ayant acquis du propriétaire à peu près toute l'édition de cette variété nouvelle de

poirier, nous sommes en mesure de fournir tout de suite aux amateurs des multiplications de deux ans sur franc et sur cogn. au prix de 5 à 6 francs le sujet.

Prince Germain. Gr. fd. 1 q. sept.

Princesse Charlotte (Esp.). Moy. foud.

— Marie (V. M.). Fr. moy. tr.-bon, mûr nov. vig. moy. fert. pyr. F.

Rameau (V. M.). Fr. gr. fd. mûr nov. vig. et fert. F. pyr. h. v.

Reine des Belges (V. M.). Gr. fd. sept.

— des Pays-Bas (V. M.). Fr. tr.-gr. pyr. fort. col. fd. mûr nov. vig. f. F. pyr. h. v.

— des Poires (*Coloma* V. M.). Fr. moy. d'un rouge s. mûr nov.-déc. vig. F. pyr. dans un sol ch.

Retour de Rome (V. M.). Fr. ass. gr. fd. mûr nov. vig. pyr.

Roitelet (Biv.). Fr. pet. fd. mûr oct. vig. fert. pyr. h. v.

Rousselet Band (V. M.). Fr. pet. fd. mûr oct. vig. fert. pyr. h. v.

— Bivort. Fr. pet. fd. exq. mûr de nov. en janv. F.

— de Janvier (Biv.). Fr. pet. fd. 1 q. mûr janv. F. C.

— de Meester (V. M.). Moy. fd. 1 q.

— de la St-Nicolas (Biv.). Fr. pet. fd. exq. mûr en déc. F. C.

Sabine (V. M. ?). Stoffels à Malines 1819. Fr. tr.-gr. mûr fin d'oct. vig. fert. pyr. h. v.

Sans pareille. Fr. moy. cass. mûr fév.-mars. vig. pyr.-F.

Seigneur (Espereu). Fr. gr. obt. mi-fd. mûr au comm' de sept., arb. moy. tr.-fert. F. pyr. h. v.

Seutin (Bouv.). Fr. ass. gr. fd. mûr déc.-janv. moy. tr.-fert. F. t. l. pyr.

Sickel pear (Poire von Sickel), genre de *Rousselet*. Fr. pet. arr. fd. à peau rouge, mûr oct. vig. F. Pyr. h. v.

Schobdencourt. 1 q. fd. suc. comm' de janv.-fév.

Soldat Laboureur (Esp.). Fr. moy. et gr. forme all. mûr en oct., arb. vig. en sol lég. F. belle pyr. en h. v.

Souvenir d'Espereu (Berckmans). Fr. moy. pyrif. mûr en nov.-déc. vig. pyr.

— (Bivort). Moy. fd. exq. nov.

Souveraine du Printemps. Tr.-gr., bon, avril.

St-Jean-Baptiste Van Mons (V. M.). Gr. fd. 1 q. janv.-fév.

- Suffolk Town (Thorn?) D'orig. angl. 1 q., prov. de la *Bergam. Gansel*, fd. C. oct. exc.
- Surpasse Crésane (V. M.). Fr. de la forme et du goût de la *Berg. Crés.* mûr. oct.-nov. ass. vig. F. pyr.
- Suzette de Bavay (Esp.). Fr. moy. mûr de mars-avril, à tiges fortes dr. et serr. belle pyr. nat.
- Théodore Van Mons (V. M.). Fr. gr. fd. mûr. oct.-nov. vig. fert. pyr. h. v.
- Triomphe de Jodoigne (Bouv.). 1 q. gr. fd. mûr en nov. et déc.
- de la Pomologie, Fr. exc. mûr déc. vig. fert. pyr. et h. v.
- Urbaniste (Coloma). Fr. gr. fd. mûr. nov. arb. moy. F. pyr.
- Shedding (V. M.). Gr. fd. nov. arb. moy. F. pyr.
- Van Assche (Bouv.). Gr. fl. 2 q. nov.-déc., vig. f. pyr. h. v.
- Van Mons (Léon Leclercq). Fr. gr. pyr. fd. mûr nov.-déc., vig. f. pyr. h. v.
- Vicomte de Spoelberg (V. M.). Moy. fd. nov.
- Vineuse (Esp.). Var. nouv. encore peu étud.
- Virgouleuse (Syn. *Poire Glace*). Fr. gr. tendre, beurré, rel. mûr, nov.-fév. F. et C. en esp. exp. ch.
- Parmi toutes les variétés trouvées ou obtenues en France, on peut considérer celle-ci comme produisant le plus beau et le meilleur fruit à espalier, à l'exposition de plein midi.
- Virgoline (Newlown's).
- Wellington. Fr. moy. fd., mûr oct.-nov., arb. vig. f. F. pyr.
- Willermoz (Biv.). Gr. fd., 1 q., nov.
- Zéphirin Grégoire (Grég.). Fr. pet. ou moy. beurré, fd. mûr déc.-mars, arb. moy. F. esp. pyr.
- Louis (Grég.). Moy. fl., janv.-fév.

N. B. Du 15 janvier au 15 avril de chaque année, nous fournissons des greffes de toutes les variétés de poiriers comprises dans notre collection, au prix de 20 à 40 centimes par rameau d'une longueur de 15 à 30 centimètres.

Les amateurs peuvent également se procurer, à notre établissement, des multiplications de ces variétés, soit sur franc, soit sur cognassier, surtout des meilleures ou des plus nouvelles, au prix de 1 à 3 francs le pied, selon la force ou l'importance des sujets, et suivant leur degré de rareté ou de nouveauté.

Quant au prix des sujets très-forts ou extraordinaires, et à celui des hautes tiges, il sera réglé sur place, de gré à gré ou par correspondance.

POMMIERS

En Belgique, le fruit du pommier n'est pas à beaucoup près en aussi grande estime que celui du poirier. En effet, on y trouve peu d'amateurs qui en possèdent une grande collection ou qui se soient occupés d'une manière spéciale du semis des pepins dans le but d'en obtenir des variétés nouvelles. Dès longtemps, on a relégué le pommier dans les vergers, et si on lui accorde une place au potager, à côté du poirier, c'est sur doucin ou paradis : ce qui ne lui permet pas de prendre une grande extension. Depuis l'époque de l'invasion du *puceron laniger*, un grand nombre d'espèces de pommiers souffrent de cet insecte : ce sont ces arbres nains du potager ou du jardin d'agrément qui offrent en général l'aspect le plus désagréable, surtout au commencement de la belle saison. Si cette maladie continue et si l'on ne trouve pas un moyen de la combattre et d'y remédier tout à fait, on sera obligé de bannir définitivement le pommier de nos jardins et de le réserver exclusivement pour nos vergers. En avant, au moyen d'une éponge et avec de l'eau de pluie savonnée, les parties de l'arbre atteintes du puceron *laniger*, on parvient à en faire disparaître les larves sur les tiges et sur les branches.

Il existe des espèces et des variétés de pommiers qui paraissent en avoir été préservées jusqu'à ce jour. Celles-ci auront peut-être le privilège d'être admises à la culture de petite dimension dans les potagers. Il est à remarquer que les pommiers sur franc, sur doucin et sur paradis, plantés dans un sol un peu humide et fort sont plus sujets

aux attaques des lézils insectes. De plus, les jeunes sujets écussonnés propagent plus promptement la maladie que les pieds qui ont reçu la greffe en fente. Toute plaie attire le puceron qui s'y fixe.

Dans les contrées plus froides, on s'est appliqué de préférence à la culture du pommier, et l'on y a gagné des variétés nouvelles qui, pour la forme, le goût et la durée, paraissent préférables à la plupart de nos anciens fruits. Nous avons introduit directement les variétés les plus remarquables, et nous en offrons aujourd'hui les greffes aux amateurs. Elles seront fournies à la même époque que celle des poiriers.

**Collection de Pommiers dont notre établissement fournit
des greffes et des multiplications.**

Nous avons conservé les noms des variétés sous lesquels elles ont été reçues dans nos collections.

Ananas de Copenhagen. Arb. peu vig. ass. f. fr. moy. 1 q. nov.-déc.	Goldendrop. 1 q. pet. tab. mars, délic. f.
Bedfordshire fundling. Fr. tr.-gr. 1 q. fin d'hiver; pour la table et la cuisine.	Gooseberry apple. 1 q. gr. cuis. mars-mai, saveur partic.
Baddow pepin ou Ribston pippin. 1 q. moy.; fr. de table et cuisine; déc.	Gravenstein. 1 q. gr. et juv. tab. et cuis. nov.
Calville d'hiver à côtes. 2 q. moy. déc.	Gros Richard.
— blanc d'hiver. Arb. chancr. tr.-f. fr. gr. 1 q. janv.-mars.	Hawthornden. 1 q. gr. cuis. août-nov. f.
Camenal appel.	Impératrice Joséphine.
Carolina Augusta.	Keddlestone Pippin. 1 q. pet. table, mars et mai; exc.
Cornish Gilli flower. 1 q. moy. ou gr. fr. de tab. déc.	King of the Pippins. 1 q. moy. cuis. et tab. nov. f.
Dantziger Kautapsel. Tr.-beau et gr. fr. d'aut. en esp. goût rel. forme de Calville.	La belle fleur anglaise. 1 q. gr. nov.-déc.
D' George Liegel.	La Limbourgeoise. 1 q. gr. nov.-févr.
Edelkönig (ou le Roi très-noble). Gr. et préc. fr. d'aut. gross. d'une Calv. rouge d'aut., plus pl. et rég.	Mannington's Pearmain. 1 q. gr. table et cuis.; var. tr.-vig.
Englische Koning's pearmain (le Royal pearmain) (?). Ass. gr. goût rasfr. exc.	Macleans Favourite. 1 q. moy. table, oct.-janv.; exc.
— winter gold pearmain. Fr. de luxé, ass. gr. préc. pour tab. d'hiv. d'exc. goût.	Monstreuse de Bergerac.
Erzherzog Franz-Karl.	Monstrous Pippin. fr. tr.-gr. 1 q. mûr sept.-oct.
— Johan. Gr. fr. d'aut. de tab. ov. ch. fine, vin. suc.	Mooss's Incomparable. 1 q. gr. table et cuis. avril-juin.
Erzherzogin Sophie.	Nompareil ou Pitmaston Russet. Fr. de janv. et mars, moy. 1 q. f. fr. de table.
Francau romain. Arb. tr.-vig. et f. fr. ass. g. 1 q. hiv.	Northern Spy. 1 q. gr. table, avril-juin; délic. var. fl. d'Amér.
Gelber Pallas-Apfel.	Norfolk-Beaufin. 1 q. gr. cuis. avril; exc. Ogle's grove Pepin.
	Papagai Appel (Pomme de Perroquet). Belle et gr. p., coul. rem., fr. délic. en compote.

(?) Pearmain, mot anglais, veut dire *Pyrus magnus* ou grosse pomme.

- Pearson's plate. 1 q. pct. table, mars; exc. fr. de dess.
- Pepin d'Or. 1 q. pct. t. janv., s. parad. f.
- Pigeonnet. Fr. pct., 2 q., déc.-févr.
- Pomme pour dessert, de Bohême.
- d'Anjou. Court-pendu vert.
 - de Boutignie (Léon Lecterc).
 - De Jonghe, orig. de Bavière.
 - de Sarreguemines.
 - Jaune à peau lisse.
 - Narcisse de Rue.
 - Oignon. Déc.-avr., f. 1 q.
 - Parmentier. Gr. 1 q. d'hiver.
 - Rouge de Kent.
 - de 18 onces.
 - safran.
 - S'-Sauveur. Gr. 1 q. hiv.
 - tulipée. Tr.-h., ass. gr., exc. fr. de t., goût délic. f., mûr janv.-mars.
- Princesse royale (Hulbert's). Fr. de dess., 1 q., 5^e gross., mûr en mai.
- Reine des Reinettes. 1 q., gr. ou moy., avr.
- Reinette d'Allemagne. 1 q. moy. fin d'hiv.
- d'Angleterre. Arb. tr.-f. gr., 1 q., hiv.
 - la Grosse. Fr. tr.-gr., 1 q., hiv.
 - Daniel. Fr. gr., 1 q., hiv.
 - de Canada. Arb. vig. f., fr. de table, gr., 1 q., hiv.
 - de Cantorbéry. Fr. tr.-gr., comp., 1 q.
 - d'Espagne. Arb. tr.-vig., pyr. et pour nain sur doucet et par., fr. gr., 1 q., hiv.
 - d'hiver. 1 q., gr., printemps.
 - de Hollande. Arb. vig., tr.-fr., gr., 1 q., hiv.
- Reinette de Hongrie.
- des Menonites.
 - de Versailles. Arb. vig. f., fr. moy., 1 q., hiv.
 - de Vignau. Gr. déc.-mars, 1 q.
 - de Dillen. Fr. moy., tr.-beau, de table, en hiv.
 - dorée. Arb. ass. délic. tr.-f. s. douc. et parad., fr. moy., 1 q., hiv.
 - English Granat. Fr. moy., tr.-beau, préc. fr. de table, angl., forme sphér.
 - grosse de Hall.
 - Glantz. Fr. moy., tr.-beau, d'hiv., forme Bergamote.
 - grise du Canada. 1 q., gr., hiv.
 - nouvelle d'autonne.
 - verte. 1 ou 2 q., moy., nov.-mars, arb. vig. f.
- Royale d'Angleterre. 1 q., gr., hiv.
- Sary Alma. Fr. sph. mûr en aut., arb. gr. et vig., 1 q.
- Swaar's Apple. Fr. gr., arr. à p. jaune, hiv., mûr en déc.
- Triomphante. Arb. tr.-vig. ass. f., fr. gr., 1 q., hiv.
- Winter birstorfer de Nikéas (Reinette Bât, orig. de Saxe). Fr. de table d'hiv., ch. douce, exc., f. rég., 1 q.
- Majetin. 1 q., tr.-gr. fr. pour la cuisine.
- Cette variété très-rustique n'est passujette aux attaques du puceron lanigère.
- Wyken Pippin, 1 q., 5^e gr. pour le dessert, chair tendre et aromatisée, mûr en déc.

Les pommiers seront livrés en greffes, longues de 15 centimètres au moins, pour les dernières nouveautés; les autres le seront en greffes de 30 à 50 centimètres :

12 au choix, pour 3 fr. ; — 25, 5 fr. ; 50, 10 fr. ; — 75, 15 fr.

Les multiplications de quelques variétés des plus remarquables seront cotées de 1 à 5 fr., selon la force des sujets et d'après leur rareté.

PRUNIER.

Le prunier, déjà connu anciennement en Europe, a conservé la dénomination qu'il avait autrefois. D'après l'opinion assez générale des écrivains, il serait en effet originaire des régions européennes où le type primitif croît à l'état sauvage dans différentes contrées.

Les fruits à noyaux se reproduisent facilement de graines, et il est reconnu maintenant, par des expériences répétées, que les noyaux de certains fruits bien mûrs

donnent souvent des variétés meilleures et plus convenables, sous plusieurs rapports, au climat où ils ont été obtenus de semis. Il n'est donc pas invraisemblable que le prunier sauvage à épines, de même que le poirier sauvage, également épineux, aient donné naissance, par des reproductions successives, aux belles et bonnes variétés de fruits nouveaux dont l'Europe, l'Asie et l'Amérique sont aujourd'hui en possession. En effet, toutes les variétés de pruniers ont un caractère commun qui se rapporte, soit à la prune d'Europe, soit à la prune de Damas, originaire de Syrie. Ces caractères ont fixé l'attention d'un célèbre cultivateur de pruniers, et ont servi de base au système de classification adopté, ces dernières années, par M. G. Liegel de Braunau, en Bavière. D'après ce système, toutes les variétés se partagent en deux classes, dont chacune a deux divisions et quatre sous-divisions.

La 1^{re} classe comprend les variétés à fruit long; elle est divisée : 1^o en variétés à jeune bois d'une écorce lisse; 2^o en variétés à jeune bois duveté.

Chaque division a quatre sous-divisions : la 1^{re} comprend les fruits bleus, la 2^e les rouges, la 3^e les jaunes et la 4^e les fruits verts.

La 2^e classe renferme les pruniers Damas à fruits d'une forme arrondie.

La 1^{re} division compte les variétés à écorce lisse légèrement duvetée; la 2^e les vrais Damas, dont l'écorce se couvre en été d'un duvet apparent.

Les quatre sous-divisions sont établies de la même manière que celles de 1^{re} classe.

Si cet ordre, du reste très-rationnel, était généralement adopté, il serait facile à tout amateur qui obtiendrait un fruit nouveau et remarquable, d'assigner une place à son produit dans l'une ou dans l'autre produit de cette classification, où il serait inscrit par les amateurs, par les horticulteurs marchands et par tous ceux qui s'occupent de publications ou de travaux relatifs soit à la science, soit à l'art horticole.

Culture.

Le prunier forme en général des racines traçantes et assez minces; il ne demande pas une terre profonde, mais franche, légère et fraîche, sans pourtant être trop humide. On cultive les variétés peu fortes en espalier et en pyramide; les espèces vigoureuses réussissent mieux en haut vent.

Dans plusieurs localités de la Belgique, surtout dans les endroits légèrement accidentés, nous avons remarqué des pruniers cultivés en haut vent et à tête qui paraissent avoir au delà de 50 ans d'âge. Si parfois des arbres peu développés encore dépérissent, il faut l'attribuer, pensons-nous, en grande partie à ce que l'on néglige de supprimer les bois morts et inutiles, et de cicatriser soigneusement les plaies après la taille du printemps.

Pour avoir des arbres durables et non sujets à la gomme ni aux rejetons de pied, on sème des noyaux de la mirabelle blanche, que l'on greffe en écusson ou en fente, dès que le sujet se trouve dans les conditions requises pour subir cette opération avec espoir de succès.

Les multiplications du prunier myrobolan, originaire de l'Amérique septentrionale, rejettent moins du pied que celles des autres sortes. Elles sont employées pour recevoir la greffe d'un grand nombre de variétés de pruniers destinées à l'espalier. Le myrobolan violet, hybride obtenu de l'abricot noir et du myrobolan ordinaire, paraît préférable pour la plupart des variétés vigoureuses.

Pendant les trois ou quatre premières années, on est obligé de tailler le sujet greffé, afin de lui donner la forme voulue; ensuite, on se borne à enlever ou à raccourcir les gourmands, c'est-à-dire les rameaux trop vigoureux, et les bois morts ou inutiles.

Du reste, on est loin encore de savoir le dernier mot, quant à la culture du prunier. Nous croyons, avec plusieurs de nos confrères ou amis, que les expériences faites en dernier lieu dans divers endroits du pays, nous mettront sur la voie d'autres découvertes, peut-être plus concluantes.

En attendant, nous engageons tous les amis du progrès de l'horticulture pratique à semer les noyaux de bonnes prunes parfaitement mûres; ils en obtiendront probablement un résultat satisfaisant.

Collection de Pruniers.

Nous en offrons des greffes et des multiplications.

- A dattes rouges. Fr. ov. rouge, str. long, ch. jaune ferme agr., aigre-doux, arb. gr. fert.
 — violettes. Fr. gr. ov. viol. foncé, ch. vert-jaune, exc. douce, vin.
- Albany Beauty. Fr. moy. de 1^{er} q., mûr en août, belle pr. de cons.
- Attesse à fruit blanc.
 — à œuf blanc.
 — strié.
- Bifère, ou portant deux fois.
- Bonnet d'évêque. Fr. moy. bleu foncé, ov. ch. serr. vert-jaun. jut. suc. vig. prod.
- Cerise rouge. Moy. rond. pl. st. long. ch. j. transp., arb. moy. peu fert.
- Columbia. Fr. gr. 1 q. de t., mûr en sept. c. p. suc. riche, arb. vig.
- D'Agea ou Robe de Sergent. Fr. moy. ov. viol. pour pruneaux, arb. vig. t. fert.
- Damas ballon. Fr. panaché.
 — blanc. Fr. pot. ov. arr. blanc-jaun., goût agr., arb. moy. peu fert.
 — jaune tardif.
 — noir. Fr. gr. ov. rouge foncé d'un côté, pâle de l'autre, arb. peu vig.
 — rouge. Fr. moy. ov., arb. pet. peu fert.
- Dame Aubert. Fr. all. jaune d'or, ch. ferme, arb. vig.
- De Bleeker à fruit jaune.
 — Catalogne. Fr. pet. all. jaune, arb. moy. et fert., cult. en pots, cons^o en serre.
 — Livonie.
 — Suisse.
 — Pelz.
 — St.-Catherine. Fr. jaune suc. pour pruneaux.
 — St.-Thérèse. Gr. fr. un peu all., d'abord jaune, puis rouge tach.; arb. vig. fert., mûr fin sept.
 — Waterloo. Fr. gr. all. jaune; arb. vig. et fert.
- Diaprée, à fruit blanc, la vraie sorte, pet. ov. jaune, st. long, ch. jaune, exc. tr. jut. goût rel. pierre se dét. arb. pet. fert. pet. fl. tard.
- D'octobre, violet. Moy. rond, pl. roug.-brun st. l. ch. blanc-jaune, exc. goût rel.
- Doré.
- Drap d'or (Esp.). Fr. moy. ov. jaune-paille, fond. suc., arb. ass. vig. lent à porter.
- Esmerald drop.
- Etienne.
- Faisant violet.
- Fancy.
- Favorite (Buel). Fr. 1 q. de tab., mûr en sept., col. j.
- Goutte d'or de Coë. Fr. tr.-gr. ov. jaune d'or, st. l. ch. ass. jaune, tr.-doux, arom., arb. vig. fert.
- Grosse bleue de Vonderworm.
 — Cornemuse. Fr. gr. all. violet bleu, pour pruneaux.
 — de Frauendorf.
 — de Hongrie.
 — de Kumps.
 — jaune de Peter. Gr. jaune, pl. ronde, st. l., ch. jaune, tr. jut. fond. suc. arb. gr. fert.
 — de Porster.
 — nouvelle de Dürrell. Pet. jaune-vert. ov. large au c. st. tr. l., ch. j. jut. goût suc. tr. rel.
 — rouge de Cooper.
- Hâtive, dite la Favorite (Rivers). Fr. moy. 1 q. de t. mûr en juill. c. pourp.
 — de Galais.
- Jaune de Jérusalem. Fr. tr. gr. ov. jaune de cire, exc. goût, arb. vig. irrég. fl. gr.
- Jefferson. Fr. tr. gr. jaune ov. arb. tr.-vig. et f. pour h. t.
- Impérial de Downton. Fr. moy. ov. beau jaune, jut. goût rel. dél. arb. vig. tr. f.
 — Ottoman. Fr. moy. ov. jaune vert. ch. ferme, fd. suc. arb. fort tr. f.
 — rouge. Fr. tr. gr. ov. rouge, pomp. arb. tr. vig. et f.
- Incomparable. Fr. moy. pr. ov. viol. foncé, ch. jaune d'or, goût suc. rel. petit arb. tr. f.
- Kirke's. Gr. ov. viol. foncé, st. tr. l. ch. jaune, tr. fl. jut. goût rel. arom. suc. p. se dét. arb. vig.

La Reine-Mère (Queen Mother).

— petite sucrée.

— rouge.

Merveille de New-York. D'orig. amér., var. peu connue et non étud. suffis.

Mirabelle de Bohn. A fr. str.

— de Metz. Fr. moy. all. rouge viol., arb. moy. f.

Mirabelle de Vienne. Fr. pet. ov. arb. peu vig. mais fert.

— rouge. Fr. pet. forme œuf de pig. rouge br. ch. blanc jaune, sucr. rel. arb. pet. peu fert.

Monsieur. Fr. gr. rond viol. fl. arb. vig. tr.-prod.

Montfort. Fr. gr. ov. viol. noir, chair jaune fl. arb. vig. tr.-fert.

Monstrueuse.

Morillon.

Musquée.

Noire hâtive.

Orange. 1 q. gr. fr. cuis. mûr en sept. col. partic. de bronze d'or.

Orléans (Smith's). Gr. fr. ov. 1 q. mûr en sept., fr. pour cuis.

Perdrigon à fruit blanc. Ov. pet. jaune st. l. ch. blanche jaune, jut. exc. fd. arom. arb. moy. peu fert.

— — tardif. Pet. ov. bleu foncé, st. l. ch. jaune blanc. t. tr.-b. suc. arbr. moy. fert.

— — violet. Fr. dist. moy. court ov. st. l. ch. bl. jaune ou j. d'or, tr.-jut. t. doux, p. ne se dét. arb. moy.

Prince of Whales. Fr. gr. arr. pourpre cer., arb. tr.-vig. et fert.

Prune abricot. Fr. moy. arr. aplati, exc. ch. jaune jut., goût rel., arb. ass. gr. et fert.

— de Braunau. Fr. jaune sucr. pour pruneau.

— de Dörrel. Fr. moy. arr., arb. pet., tr.-f. en pl. band. de jard. pot.

— de Gutrier. Fr. gr. arr. jaune, goût rel., arb. vig. et fert.

— poire.

— rouge. Fr. gr. ov. dépr. bl. jaune à tach. rouge ch. blanc jaune arom. musq., arb. moy., fert.

Queen Victoria.

Cette variété, assez vigoureuse, est très-fertile cultivée en pyramide; son fruit, de la grosseur d'un jaune d'œuf, est gros, excellent; mûr fin d'août et ce de sept.

Reine Claude à fruit blanc. Fr. moy. rond pl. ch. jaun. v. jut. tr.-doux.

Reine Claude à fruit bleu. Fr. moy. rond. appl. bleu roug., goût vin. rel., arb. vig. fert.

— — noir.

— — d'automne. Fr. moy., 1 q. de t. mûr oct., v. exc.

— — de Bavay (Esp.). Fr. gr., jaune verd., fl. piq. de viol. ou marbr. de rouge, arb. vig., fert.

Cette variété, pour produire son fruit dans toutes ses qualités, demande l'espalier à bonne exposition en plein midi; mûr fin de septembre et en octobre.

Reine Claude d'Oberdick.

— — dorée. Fr. moy. arr. jaunâtre, d'un goût excellent, mûr fin d'août en pl. vent.

— — grosse verte. Fr. moy. arr. jaun. vert; ch. jaune verd. transp., goût agr., la meill. Pr. du cél. Liegel.

— — Hudson.

— — impériale. Fr. vert, tr.-gr. ov., arb. vig. et fert.

— — Lawrence. Gr. moy. ov. bleu, se détach. facilement du noyau.

— — nouvelle. Fr. tr.-gr. et excell.

— — rouge. Fr. moy. ov. rouge; arb. peu vig., tr.-fert.

— — tardive. Fr. moy. blanc, ov.; arb. vig. et fert.

— — Van den Broeck. Parf. de la Reine Cl. ord., fr. plus gr. ch. se détache bien.

— — verte tardive.

Royale. Fr. gr. rond. appl. bleu rougeâtre foncé; arb. moy. prod.

— de Braunau. Fr. gr. bleu rougeâtre, vin. rel.; arb. vig. fert.

— de Meyer.

— Hâtive de Niketas. Fr. moy. ov. ch. jaune d'or, goût exc.; arb. de gr. moyenne, fert.

— tardive de Paris.

Sans noyau. Fr. moy. rond, violet et rouge; arb. vig. fert.

Semis de la Prune St-Jean.

— de Pond. Fr. gr. pourp. ov.; arb. vig. fert.

— de Schopshire. Fr. gr. bleu noir, ov. peau mince, ch. vert jaune, un peu aigre, jut.

Sultana Erik. Fr. pet. ov. bleu noir, ch. fond jaune; arb. vig. fert.

Thomas.

Transparent.

Verte d'Italie. Fr. tr.-beau, exc., arb. vig. fert.

Vineuse. Fr. pet. ov., goût doux et délic.;
reste un mois sur l'arbre.

Washington purple. Fr. gr. pourpre; arb.
vig.

Le prix d'un rameau, long de 15 à 25 centimètres, est de 15 à 30 centimes; au choix, il est de 33 centimes. Les multiplications d'un nombre limité de variétés nouvelles et remarquables seront fournies au prix de 1 à 3 francs, d'après la force des sujets.

VIGNES.

On comprendra facilement que toutes les variétés de Vignes, sous nos climats, n'ont pas de fruits qui mûrissent en espalier et moins encore contre échalias. A l'exception d'une dizaine de variétés qui réussissent à une bonne exposition et dans un sol léger, chaud et bien préparé, soit contre échalias, soit en espalier, les autres ne donnent des fruits d'une maturité convenable que dans une serre. Depuis un certain nombre d'années, plusieurs amateurs fortunés construisent des serres plus particulièrement destinées à la culture de la Vigne. C'est là qu'ils arrivent au résultat désiré, quand, toutefois, ces serres ont été construites suivant les règles de l'art et que la plantation des pieds de Vignes est faite avec les soins nécessaires, d'après la nature du sol, les qualités du sujet et l'exposition de la localité.

Alemanna ou Faux Muscat. Grains très-gros, ovales, blancs, d'un goût très-doux et savoureux, rappelant celui des muscats; grappe de grandeur remarquable. Raisin de table.

Amelia (Vibert). Gros grains, ovales, noirs, feuilles découpées.

Barbarossa. Gros grains, elliptiques, serrés, roses, grappes grandes et longues. Raisin de table.

Bernard (S^r). Gros grains, ovales, blancs.

Carniole noir. Grains gros, longs, courbés, noirs, rougeâtres, charnus; grappe grande, longue, dégagée. Fruit de table.

— à fruit blanc. Grains très-longs, courbés en forme de corne, blancs, vitreux, charnus; grapp. grandes, longues, dégagées. Rais. de tab.; mûr en octobre.

Catalanesca di Resina. A grains gros, ovales, d'un noir rougeâtre, voilés de blanc. Succulent et savoureux; grappe grande et dégagée.

Chasselas angevin. A grains ronds et peu serrés, d'un bl. jaun., de grandeur moyenne; feuilles plus découpées que dans le Chasselas de Fontainebleau. La 1^{re} fructification a eu lieu en 1848, vers la fin d'août.

Chasselas blanc musqué.

— Blussart blanc. A gros grains.

— Duhamel (Vibert). Gros grains, belles grappes.

— de Fontainebleau.

— gros Coulard. A gros grains bl., très-hâtif.

— hâtif de Ténériffe. De Bar-sur-Aube.

— Joannin. A grains ovoïdes, jaune doré, gr. lâches et dégagées.

— Napoléon.

— perle (grosse) de Hollande.

— royal. A grains ronds et gros; maturité 15 sept.

— — musqué (Syn. Joseling's S-Albans).

— Vibert (Vibert). Gros grains, ronds et blancs.

— Vroege Van der Laan. Le plus gros et le plus hâtif sous nos climats.

Duret blanc. Grains gros, ronds, blancs, vitreux, durs; grappes très-grandes, composées de plusieurs petites; raisin de table.

— de Sicile. A grains gros, noirs et ovales; à grappes régulières et dégagées; d'un goût très-doux, succulent et exquis. C'est une des meilleures espèces de raisin de table.

— noir. Gros grains, ovales, noirs,

- doux, savoureux, peau épaisse et tenace; grappes grandes, longues et rameuses. Cette variété ressemble beaucoup au Duret de Sicile.
- Del Vasto** (nom d'une famille). Grains fort gros, elliptiques, transparents, savoureux; grappes très-grandes, longues et dégagées. En serre, il lui faut une exposition très-chaude.
- Frankendaler**. Généralement connu.
- Grosse perle**. Egalement connu. Variété à gros grains, blancs et ronds.
- Isabelle d'Amérique** ou Raisin fraise. A grains ronds et ovales, gros, noirs ou noir-rougeâtre, charnus, succulents, très-doux; grappes régulières. Cette vigne est très-robuste et fructifère.
- variété nouvelle. A grains d'un coloris gris, de grandeur moyenne, de forme ovale et d'un goût particulier.
- Jouanen**. A gros grains, ovales et blancs.
- noir. Grappe très-grande, dégagée; grains très-gros, ovales, noirs, charnus, succulents et doux: espèce peu productive.
- Lacryma Christi**.
- Larme de Notre-Dame**. Grains très-gros, ronds ou ronds-ovales, blancs, tendres, transparents, très-succulents, doux et exquis; grappes extraordinairement grandes, longues et dégagées. Cette sorte de vigne exige une exposition très-chaude.
- Léoni Szollo**. A grains ovales, allongés et blancs.
- Madeleine de Jacques**. Grains moyens, ronds, blancs.
- Vibert. Grains blancs, moyens, ovales, petites grappes.
- Malaga**. Grains moyens, ronds, d'un noir rougeâtre, d'un goût très-aromatique; genre de Muscat; grappes régulières.
- Malvoisie**. Grains petits, ovales, blancs, succulents, doux; goût du Muscat; grappes régulières, longues et dégagées; vigne à cultiver dans un sol pierreux et chaud.
- Montese Clivia**. Grains très-gros, ronds, arrondis, noirs, voilés comme d'une fumée, sucrés, charnus et moelleux. Les grappes sont magnifiques, longues et dégagées.
- Morgane (Vibert)**. A gros grains, ronds, d'un noir violacé.

Morillon d'Espagne. A grappes rondes, fruit arrondi, noir, goût relevé.

Muscat blanc.

- blanc, hâtif, de Saumur (Courtillier). A grains ronds, moyens, le plus hâtif des Muscats blancs.
- blanc, hâtif, du Jura.
- Jésus. A fruit blanc; c'est le premier fruit blanc qui mûrisse.
- de Frontignan.
- Frontignan noir (Caillaba).
- d'Alexandrie. A grains très-gros, ovales, blancs.
- de Sarbelle. A grains gros, ronds et noirs, d'un goût très-musqué.
- noir d'Angers? A grains moyens et ronds, à feuilles très-découpées.
- de la mi-août. Variété délicate, à fruit noir et à grains moyens, très-hâtive.
- gros noir de Moliterne. Grappe très-grande, longue et dégagée; grains très-gros, ovales ou ronds, noirs, très-succulents et doux. — Sol préparé à l'avance. Exposition très-chaude.
- romain. A grains gros, ronds, blancs, durs, vitreux; d'un goût très-doux et excellent; grappe régulière, dégagée. Cette espèce demande un sol chaud et une exposition très-chaude pour acquérir toutes ses qualités.
- rouge. A grains moyens, ronds, noirs, rougeâtres, succulents et très-doux; grappes moyennes, courtes. Il a besoin d'un sol pierreux et d'une chaude exposition.
- tardif. Grappe régulière, longue et dégagée; grains blancs, ronds, mous, succulents.
- Nogaret (Vibert)**. A gros grains presque ronds, d'un noir violacé.
- Précoce Malingre**. Connu.
- Raisin blanc de Catalogne**. A grains gros, ovales ou elliptiques, blancs, charnus, doux et d'un goût excellent; à grappe grande, longue et dégagée. Ces grappes se conservent jusqu'en février.
- Raisin blanc de Corinthe**. Grains très-petits, ronds, blancs, mielleux, sans semences; grappes petites et courtes.
- clochette. Grains gros, ronds, blancs et transparents; grappes régulières, longues et dégagées; d'un goût doux et succulent. Cette sorte ressemble aux Chasselas.

- Raisin de Bordeaux.** A grains petits, ronds, noirs, un peu durs, mais savoureux; à grappes moyennes.
- de la Corse (Bastia, château de l'île de Corse). A grains très-gros, ronds et blancs, transparents; grappes très-grandes et longues.
 - de la Pouille, rose grosse. Grappe grande, belle, dégagée, fruits ronds, roses, d'un goût agréable et succulent.
 - de la Pouille, rose petite. A grappe régulière, longue et dégagée; à grains petits, ovales, roses, doux et d'un goût exquis.
 - de Maroc noir. Grains gros, ovales, noirs, mielleux, charnus, savoureux; grappes grandes et dégagées.
 - de table.
 - gelé noir. Grappe régulière et serrée; grains gros, ronds ou peu ovales, d'un noir rougeâtre, charnus et d'un très-bon goût.
 - noir de Catalogne. A grains gros, ovales, noirs, charnus, d'un goût doux et excellent; grappes grandes, longues et dégagées.
 - noir de Corinthe. A grains tr. petits, rouge foncé, tr. doux, sans semences; à grappes petites et courtes.
 - noisette. Grappe régulière, serrée, avec des grains gros, ronds, blancs, vitreux; le goût de ce raisin ressemble à celui de la Sanginella.
 - Pan (dieu Pan des Anciens). A grappe très-grande, longue et serrée; à grains gros, ronds et charnus.
- Raisin S^c-Marie.** Grappe magnifique, dégagée, grains gros; peu ovales, charnus, durs, noir-rougeâtre. Ce fruit se conserve longtemps pendant l'hiver.
- prune. A grande grappe, longue et dégagée; à grains gros comme une petite prune; elliptiques, noirs, succulents et assez savoureux.
 - sucré. A grappe grande et dégagée; à grains ronds, d'un rouge foncé, d'un goût excellent.
 - Sanginella. (Raisin glacé).
- Surin.** Grains moyens, ovales, rouges, d'un goût distinct des autres raisins.
- Ténéron de Cadenet.** Gros grains ovales, blancs.
- Téton de Vache.** Grain long, obtus aux deux bouts, blanc, transparent, savoureux; grappe longue, dégagée. Cette espèce exige une exposition très-chaude.
- Tramontana.** A grappe grande et longue, serrée; à grains gros, ronds, blancs, durs, vitreux.
- Trois fois Pan.** Grappe très-grande, longue et dégagée; grains très-gros, ovales, noirs, charnus; fruit succulent.
- Versten (Vibert).** Gros grains, ronds et blancs.
- Vigne de Schiraz.** Déjà connu.
- de la Palestine. Connu.
 - rose noire. Grappe grande, longue, dégagée; grains gros, ronds ou ronds-ovales, noirs et charnus.

N. B. Le prix de chacune des variétés de la collection est établi comme suit :

Pour les variétés qui sont déjà en culture, à 1, 2 ou 3 francs le pied, suivant la force des sujets ou leur degré de nouveauté.

Quant aux variétés nouvelles et non mises encore en culture, on fera connaître aux amateurs le prix de celles qu'ils désireraient. Ces plantes sont cultivées en partie dans des pots, d'autres en pleine terre dans un sol léger et à l'air libre.

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.
Plantes nouvelles	1 — 2
— de serre chaude	3 — 4
— — tempérée.	4 — 6
— — froide.	6 — 7

Collections spéciales de Plantes de Serre chaude.

Achimènes	7
Broméliacées.	7
Cactées.	8 — 9
Cycadées	9
Cyclanthées et Pandanées	9
Dracœnées.	9
Franciscea	9 — 10
Gloxinia	10 — 11
Lantana	11
Orchidées	11 — 12
Palmiers	12 — 13

Collections spéciales de Plantes de Serre tempérée et froide.

	Pages.
Azalea indica.	15 — 14
Camellias	14 — 25
Fuchsias	25
Pelargonium	24 — 23
Geraniums	25
Chrysanthèmes	25
Iris Germanica	26
Phlox	26 — 27

Arbres Fruitiers.

Cerisiers	27
Fraisiers	28 — 29
Framboisiers.	30
Groseilliers	30
Poiriers	51 — 59
Pommiers.	59 — 41
Pruniers	41 — 45
Vignes.	45 — 47